



פאסט פרוט / פאסט פרוט / Fast Fruit

תרכיז נוזלי, מכיל: 100 גרם בליטר Dimethyl Amine Salt 2,4D Acid



מוסטת צמיחה למניעת נשירת פרי בתפוז, בקליפים ובאשכולית

פאסט פרוט הינו מוסטת צמיחה המיועד להפחתה של נשירת פרי הדר לפני הקטיף. ניתן להבחין בפחיתה בנשירה בתוך 7-10 ימים לאחר היישום. בנוסף, התכשיר מיועד להגדלת פרי בחלק מזני הדר.

רעילות לחי במים:	רעיל ליצורים החיים במים, עלול לגרום נזקים ארוכי טווח בסביבה המימית. אין לרסס בסמוך לנחלים ולבריכות דגים.
רעילות לדבורים:	רעילות לדבורים נמוכה.
כניסה מחדש לשטח המטופל:	4 שעות.
דרגת רעילות:	רעיל (II)

שילובים: בהדרים ניתן לשלב במשטח טיבולין.

הוראות שימוש:

פאסט פרוט ניתן ליישום בכלי הריסוס המומלצים לשימוש בפרדס. יש לרסס בלחץ נמוך מ-4 אטמוספירות. אין ליישם על עצים צעירים או על צימוח צעיר או לפני תחילת שינוי צבע הפרי. אין ליישם ברוח או בטמפרטורות גבוהות. מומלץ לרסס בשעות הבוקר או הערב. אין ליישם לאחר גשם לפני התייבשות הנוף. גשם שירד שעה לאחר היישום לא יפגע ביעילות הטיפול. אין ליישם על עצים המצויים בתנאי עקה כלשהי. מנע רחף של התרסיס לשדות ולגידולי תרבות שכנים.

הגידול	המטרה	אופן ומועד היישום	הריכוז (%)	נפח התרסיס (ל'ד')	יישום לפני קטיף (ימים)
תפוז, קליפים, אשכולית	מניעת נשירת פרי	תחילת שינוי צבע	0.018% (18 חלקי מיליון חומר פעיל)	300-100	12

רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 18/ה'צ/44 מס' או"ם: 3082

