



### מוסטי צמיחה להשראת צבע אדום בפרי בעצי פרי

החומר הפעיל Prohydrojasmon הוא אנאלוג סינתטי של חומצה ג'סמונית, הורמון צמחי, המצוי באופן טבעי בצמחים ופועל בין השאר לזירוז יצירת פיגמנטים אנתוציאנינים ולשינוי צבע הקליפה מירוק לאדום.

רעילות לחי במים:	התנשיר אינו רעיל ליצורים החיים במים.
רעילות לדבורים:	התנשיר אינו רעיל לדבורים.
כניסה לשטח המטופל:	לאחר התיישבות טיפות התרסיס על עלוות הגידול.
דרגת רעילות:	רעיל (II)

שילובים: אין לשלב בלאש בתכשירים נוספים.

### הוראות שימוש:

יש לנער את אריזת התנשיר לפני השימוש. בלאש ניתן ליישום, בכלי הריסוס המומלצים לשימוש בעצי פרי. יש לרסס בטיפות קטנות ולהגיע להרטבה מלאה של הנוף ללא נגירה. אין ליישם בלאש לאחר גשם, לפני התיישבות הנוף. אין ליישם אם צפוי גשם לאחר הריסוס. גשם שירד 8 שעות לאחר היישום לא יפגע ביעילות הטיפול. רצוי ליישם את התנשיר בשעות הבוקר או הערב כאשר לחות האוויר גבוהה והטמפרטורות נמוכות יחסית. אין ליישם בלאש על עצים המצויים בתנאי עקה כלשהי. מנע רחף של התרסיס לשדות ולגידולי תרבות שכנים. מרחקי הריסוס ממבני מגורים: חל איסור לרסס במרחק הקטן מ-50 מטר ממבנה. כשהרוח נושבת לכיוון המבנה, אין לרסס במרחק של 100 מטר ממנו. שילוט אזהרה יוצב בשטח ובו יצוין שם החומר ומועד הכניסה מחדש לשטח.

הגידול	המטרה	ריכוז (%)	נפח התרסיס	אופן ומועד היישום	יישום אחרון לפני קטיף (ימים)
תפוח מהזנים: פינק לייד, סטארקינג	השראת צבע אדום בפרי	0.2-0.1	100-200 ל"ד'	יישום בודד, מארבעה שבועות לפני קטיף ועד שבועיים לפני קטיף'	7
				שני יישומים, חודש ושבעיים לפני קטיף	
מנגו מהזנים: שלי, קנט		0.2			

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 18/ה"צ/449. מס' או"ם: לא מסווג

