



# אקדמין / אקדיין / Acadian

אבקה: מיל: 100% Ascophyllum nodosum



## תכשיר הזרנה בעצי פרי, בהדרים, בgefנ', בגד"ש, בפרחים ובגן הני

מועד יישום עליותי							מיןון (ג'/ד')	הגידול
אפשרות נספה	רבייעי	שלישי	שני	ראשון	ליישום			
כל 14 יום עד לאסף		10-14 ים לאחר הישום הקדם	עם התפתחות האשרוש העצה	שבועיים לאחר העצה	100-80	גדוד, לפט		
		תחילת היווצרות הקדם	10-14 ים לאחר הישום הראשון	בשלב עד 6 עלים אמיטיים	100-80	כרובית, כרוב, ברוקולי, קולובי		
כל 10-14 ים עד לאסף			10-14 ים לאחר הישום הראשון	בשלב עד 6 עלים אמיטיים	100-80	פטרוזיליה, טסברה, شمאי, שומר		
тон 48 שעות לאחר קטיף		7-10 ימים לאחר הטיפול הקדם	לפני התחלת פריחה	בשלב עד 4 עלים אמיטיים	100-80	מלפפון		
トン 48 שעות לאחר קטיף		14-10 יום לאחר הישום הקדם	חנעה	לפני התחלת פריחה	בשלב צימוח של 20-15 ס"מ	חציל, פלמל, קישוא, מלון		
		תחילת פריחה	7-10 ימים לאחר הטיפול הקדם	בשלב יצירת הפיקעות	100-80	תפוח אדמה		
כל 3-4 שבועות עד לאמצע תקופת הקטיף		חנעה	לפני פריחה	לפני שתילה	100-80	עגבניה למאכט		
לאחר סיום חנעה אחרונה לבול	14 יום לאחר תחילת חנעה	חנעה	לפני פריחה	לפני שתילה	100-80	עגבניה لتעשייה		
כל 10-14 ים עד חודש מסיום הקטיף		חנעה	לפני פריחה	לפני שתילה	100-80	תות שדה		
	כל 14 ים		תחילת צימוח		100-80	דשא		
כל 10-14 ים			תחילת צימוח		100-80	פרחים, ענפי, קישוש, צמחי נוי		

ראשון לשימוש בחקלאות אורגנית מס': 07/ה"צ/7323. מס' או"מ: לא מסוג.

אקדמין הוא תמצית מסיסת של אצות ים, המופקת מהאצה *Ascophyllum nodosum*, הנמצאת באזור הקר של האוקיינוס האטלנטי לאורך חופי נובה סקוטיה שבקנדה. המוצר הסופי מכיל תמצית של חומרי צמיחה והזרנה הנדרשים למורבית הגידולים, לקבלת תוצאות מיטביים. לקבלת תוצאות רצויות, יש להקפיד על מינונים מתאימים ועתמי נכון של יישום התכשיר.

מכל: חנן(N)- 0.7%-1.5%, דרchan(P) - 0.2%-1.1%, אלגן(K) - 17% - 22%

מטרת השימוש בתכשיר ויתרונותיו: השימוש באקדמין מושפר את החנתה, את גודל הפרי הממוצע ואת הרגולריות שלו, מחזק את עמידות הצמח לפגעים ומשפר את הצמיחה באופן כללי.

טבלת שימוש אקדמין: המינונים והרכוצים המומלצים יכולים להשתנות בהתאם לתנאי הגידול והאקלים בהתאם השינויים ובנסיבות השונות. השימוש נסמך על מטרום אם ניתן לפני התפתחות מצב עקה של חום או של קור. עדיף להגדיל את מטף היישומים, מאשר את המינון או את ריכוז התמיסה. ריכוזים נמוכים יותר, מומלצים בגידול עם עלווה דיליה. עם התפתחות הגידול אפשר להעלות את המינון או את הריכוז.

רעליות לח'רים במים:

רעליות לדבוריים:

כニסה חדש לשיטה המטפל:

דונת רעליות:

שילובים: הניסיון שנცבר מלמד שניין לשלב אקדמין עם מרבית תכשיiri הדבירה והזרנה. למרות זאת, לפני שימוש אקדמין בתכשיiri הדבירה והזרנה, מומלץ לבצע בדיקה מוקדמת כדי להימנע מפני העגינה. אין לשלב אקדמין בתכשיiri שיטוח המכילים גליקול או בשמנים. השימוש עלול לגרום לעגינה בגידול.

## הוראות שימוש:

התכשיר אקדמין מסיס מאוד במים ומתחאים לשימוש בריסוס על נוף הגידול או לשימוש באמצעות מערכת השקיה. המלצות ומינונים לשימוש עליותי מפורטים בטבלה הבאה:

מועד יישום עליותי							מיןון (ג'/ד')	הגידול
אפשרות נספה	רבייעי	שלישי	שני	ראשון	ליישום			
14 ים לאחר חנעה	חנעה	פריחה מלאה	לפני פריחה	לבולונ'	100-80	תפוח, אגס		
6-8 שבועות לפני קטיף	רישום סתוי	רישום קיז'	חנעה	תחילת פריחה	140-110	הדרים		
2-3 שבועות לאחר הטיפול הרביעי	אחרי החנעה	פריחה מלאה	באורך ענין ענף של 60-45 ס"מ	באורך ענין ענף של 30-20 ס"מ	100-80	גפן		
7 ימים לפני התקשות גלען	10 ימים לאחר החנעה	אחרי החנעה	פריחה מלאה	בצבע ורוד או לבן	100-80	גלוונינים		
אפשרות נוספת כל 21 ים עד קטיף		תחילת היוצרים תרמלים	לפני פריחה	בשלב עד 6 עלים אמיטיים	100-80	תות שדה, אפונה, שעועית		
כל 14 ים לאסף		ראשון הראשון	שבועיים לאחר העצה	100-80	בצל, כרתי			