



# רונסטאר / رونسٹار / Ronstar

תרכיז מתחלב, מכיל: 250 גרם בליטר Oxadiazon

הגידול	מועד הטיפול	המינון (סמ"ק/ד')	הוראות מיוחדות
<b>בטטה</b>	כשבוע לפני השתילה	400-300	1. מרססים על שטח נקי מעשבים ומוכן לשתילה. 2. יש להפעיל את התכשיר בהמטרה בכמות של 20 מ"ק/ד' לפחות. 3. משתמשים במינון הנמוך בקרקעות הקלות ובמינון הגבוה בקרקעות הבינוניות והכבדות.
אין לטפל בירקות הנשתלים תחת מעטה פלסטי			
<b>תות-שדה</b>	קדם שתילה	400	1. מרססים על שטח נקי מעשבים ומשקים בשיעור של 20 מ"ק/ד' לפחות. 2. בעת השתילה הימנע ככל האפשר מהזזת הקרקע המטופלת. 3. אין לחפות את הערוגות אלא כעבור חודש ימים לפחות ממועד היישום.
<b>עצי-נוי, שיחי נוי מעוצים</b>	לאחר ההשתרשות- בטיפול מתחת לנוף	600	1. בריסוס. 2. באמצעות מזלף גינה: מכינים תמיסת רונסטאר המורכבת מ-6 סמ"ק רונסטאר לכל 10 ליטרים מים, ומזלפים בעזרת מזלף גינה 1 ליטר תמיסה ל-1 מ"ר קרקע.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 83/ה'צ/389. מס' או"ם: 1993.



הגידול	מועד הטיפול	המינון (סמ"ק/ד')	הוראות מיוחדות
<b>הדרים</b>	מיד לאחר הנטיעה ובמשך כל הגידול-בריסוס מכוון מתחת לנוף	600	1. אם מטפלים בפס, יש לחשב את המינון לפי מימדי השטח המטופל. 2. הימנע מריסוס התכשיר על עלוות העצים.
<b>ירקות: בצל זרוע (כל הזנים)</b>	לאחר הצצת הבצל 1. בשלב 2 עלים* 2. בשלב 4 עלים	100 + 200	*טיפול ראשון בהגיע הבצל לגיל 2 עלים, כאשר אורך העלה האמיתי השני 5 ס"מ לפחות. הטיפול המשלים-בהגיע הצמחים לגיל 4 עלים.
<b>בצל מהזנים: אורי, בשור</b>	לאחר הצצה בשלב 3-4 עלים	250	על שטח נקי מעשבים, מפעילים את התכשיר מיד לאחר הריסוס. בריסוס על שטח משובש בנטי עשבים, דוחים את מתן ההמטרה לכ-48 שעות. אין לשלב רונסטאר עם קוטלי עשבים אחרים.
<b>בצל מהזנים: גרנו, מצרי, ריברסייד</b>	בשלב של 3 עלים	350	
<b>בצל שתול</b>	לאחר השתילה, לאחר שהשתילים נקלטו היטב	350	
<b>בצלצולים</b>	החל משבוע לאחר ההצצה	350	
<b>שום</b>	לאחר הזריעה ובמשך עונת הגידול	500	
<b>ירקות בשטח הפתוח בלבד: כרוביים, פלפל, עגבנייה, חציל וכרפס</b>	קדם שתילה, לפני ההמטרה הקודמת לשתילה	350	1. לפני הריסוס הקפד על הכנת מצע שתילה אחיד ונקי מעשבים. 2. לאחר הריסוס ולפני השתילה יש להשקות בשיעור של 20 מ"ק/ד' לפחות. 3. רצוי לשתול בדקר ולהימנע ככל האפשר מהזזת הקרקע המטופלת.
<b>כרפס</b>	מיד לאחר השתילה ולפני מתן המטרת הקליטה	350	1. השקה מיד לאחר הריסוס. 2. על כרפס מטופל ברונסטאר כנ"ל אין לרסס בקוטל עשבים נוסף, אלא כעבור מספר ימים.