



דיינון / دينون / Dynone

תרכיז נוזלי, מכיל: 722 גרם בליטר Propamocarb HCL

קוטל פטריות להדברת מחוללי מחלות בצמחים

דיינון הינו תכשיר סיסטמי המדביר מחלות הנגרמות ע"י פטריות מקבוצת הפיקומיצטים (פיטופתורה, ברמיה, פסאודופרונוספוריה, פרונוספוריה, פיתיום).

רעילות לחי במים:	רעילות נמוכה בינונית.
רעילות לדבורים:	התכשיר אינו רעיל לדבורים .
כניסה מחדש לשטח המטופל:	מותרת אך ורק לאחר התייבשות מלאה של התרסיס על העלווה.
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

שילובים:

בריסוס נוף ניתן לשלב **דיינון** עם דלסן, או עם קוציד 2000 או עם מנצידן. בהגמעה ניתן לשלב עם תכשירים בנזאמידזולים, אך אין לשלב עם דשנים. למרות שעד כה לא נמצאו השפעות פיטוטוקסיות של התכשיר במינוני ההגמעה המומלצים, הרי בשל הרב-גניות הרבה של הגידולים, הזנים ושיטות הגידול, אין אפשרות לערוך לבטיחות התכשיר בכל מקרה ומקרה. לכן, רצוי שהמגדל יבצע ניסוי מוקדם בצמחים בודדים לפני השימוש ב**דיינון** לבד, ובמיוחד לפני השימוש בשילוב עם תכשירים אחרים.

הוראות שימוש:

טבלה 1: ריסוס נוף להדברת מחלות כמפורט בטבלה. הריסוסים יינתנו בצורה שתבטיח כיסוי מלא של נוף הצמחים.

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד' או הריכוז (%))	נפח התרסיס (ל'ד')	יישום אחרון לפני אסיף / קטיף (ימים)
תפוח אדמה	כימשון	200-300 ¹	בריסוס קרקע: 50-30 בריסוס מהאוויר: ⁵ 5	14
מלפפון ומלון בשדה הפתוח ותחת כיסוי	כשותית הדלועים ²	300 בנפח תרסיס עד 100 ל'ד' 0.25% (250 סמ"ק ב-100 ליטר מים)	100-30 ³	3
חסה	כשותית החסה ⁴	200-300	50-30	14
כרוביים במשתלה	כשותית המצליבים ⁵	0.15% (150 סמ"ק ב-100 ליטר מים)	50-30	-

1 - לאחר הופעת המחלה בנגיעות נמוכה מטפלים עם **דיינון** 200 סמ"ק/ד' בשילוב עם מנצידן 200 ג'ד'. הטיפולים ב**דיינון** יינתנו מדי 10-14 ימים כאשר ביניהם יינתן טיפול באחד התכשירים הפרוטקטנטיים המומלצים. בנגיעות גבוהה מגדילים את מינון **דיינון** ל- 300 סמ"ק/ד'.

2 - טיפולי מניעה לפני הופעת המחלה מדי 12-14 ימים. לאחר הופעת המחלה בנגיעות נמוכה מדי 10 ימים. בנגיעות גבוהה שני טיפולים עוקבים במירווח של 6 ימים, ואח"כ שוב מדי 10 ימים.

3 - במלפפון ובמלון תחת כיסוי, לא פחות מ- 50 ליטר לדונם.

4 - מטפלים מדי 10-14 ימים. בנגיעות קשה מטפלים במינון הגבוה ובתכיפות הקצרה יותר.

5 - טיפול מונע אחת לשבוע מהופעת פסיגים.

טבלה 2: טיפולי הגמעה למניעת פיתיום וכן למניעת פיטופתורה בתות שדה. טיפול הגמעה יש לעשות כאשר הקרקע רטובה.

הגידול	המחלה	מועד הטיפול	המינון או הריכוז	אופן היישום	הערות
גיבסגית, גרבה, פלרגוניום, חלבלוב, פפרומיה, בשמת, ביגוניה פיטוניה	מקמקת (פיתיום)	חיטוי המצע לפני מילוי כלי גידול	300 סמ"ק למטר מעוקב	פיזור בתוך 10 ליטרים מים על גבי מצע הגידול וערבוב	יש לבצע את הטיפול כאשר המצע לח ולהקפיד על ערבוב טוב שלו לאחר פיזור התכשיר.
		טיפול קרקע לפני השתילה	15 סמ"ק למטר מרובע	הגמעה (בתוך 2-4 ליטרים מים למ"ר)	יש לחזור על הטיפול אחת ל-1-3 שבועות.
		ייחורים וצמחים קיימים	תמיסה בריכוז -0.15% 0.3%	הגמעה להרוויית הקרקע בעומק השורשים	
		צמחים בעציצים	100 סמ"ק של תמיסה בריכוז 0.15% לעציץ בקוטר 10 ס"מ	הגמעה השתילה להרוויית הקרקע	יש לחזור על הטיפול אחת ל-3-4 שבועות.
מלפפון בשדה הפתוח ותחת כיסוי	ריקבון תות השדה (פיטופתורה קקטורום)	טיפול קרקע עם הזריעה או לאחר ההצצה או לאחר השתילה	200 סמ"ק של תמיסה בריכוז 0.15% (1.5 סמ"ק לכל ליטר מים)	הגמעה בקיני הזריעה או מסביב לצמח להרוויית של בית השורשים במלפפון	במקרה והנגיעות נמשכות יש לחזור על הטיפול כעבור 2-4 שבועות.
תות שדה		לאחר השתילה	לכל קו זריעה או לכל שתיל	וכן למניעת פיטופתורה בתות שדה	3-2 טיפולים במירווח של 7 ימים.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 86/ה'צ/944. מס' או"ם: לא מסווג.