




# אוקטב / אוקטאף / Octave

אבקה רטיבה, מכיל: Prochloraz Manganese 50%



## קוטל פטריות להדברת מחוללי מחלות בצמחים

- 1 - לקבלת הדברה מיטבית של ריקבון חום ושל נימשון השקד מומלץ לרסס פעמיים: ריקבון חום - ריסוס ראשון בתחילת פריחה, ריסוס שני 10-12 ימים לאחר מכן. נימשון השקד - ריסוס ראשון בזמן הבלוב, ריסוס שני 15-20 ימים לאחר מכן.
- 2 - גחלון- ריסוס ראשון החל ב-30% פריחה, ריסוסים נוספים מדי 7-10 ימים.
- 3 - יש ליישם אוקטב החל מתחילת הפריחה ועד לסיימה, מדי 14 יום. הפחתה בנגיעות תתבטא בעונה העוקבת. יש להקפיד על סניטציה וסילוק תפוחות נגועות.
- 4 - יש ליישם טיפול מניעה החל מתחילת הפריחה או לכל המאוחר מהופעת נגיעות. יש לכלול במעקבות הטיפולים קוטלי פטריות בעלי מנגנון הפעולה שונה.
- 5 - לפני השתילה, טובלים את השתילים למשך 5-10 דקות בתרחיף בריכוז 0.2%. יש לערבב את התרחיף לפני כל טבילה.
- 6 - בהתאם לעוצמת הנגיעות.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 83/ה'צ/836. מס' או"ם: 3077.



רעילות לחי במים:	התכשיר רעיל מאוד לדגים ולבעלי חיים ימיים.
רעילות לדבורים:	אינו רעיל לדבורים.
כניסה מחדש לשטח המטופל:	מותרת לאחר התייבשות מלאה של התרסיס על העלווה.
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

שילובים: אוקטב ניתן לשלב עם מרפאן בשקד. אין לשלב עם מרק קליפורני.

## הוראות שימוש:

הגידול	המחלה	אופן היישום	המינון או הריכוז	נפח התרסיס	יישום אחרון לפני קטיף (ימים)
משמש, שזף, שקד	ריקבון חום (מוניליה) <sup>1</sup>	ריסוס	0.06% (60 ג' ב-100 ליטר מיס)	עד נגירה	50
שקד	נימשון השקד (פוליסטיגמה) <sup>1</sup>	ריסוס	0.06%	עד נגירה	50
שקד	גחלון (אנתרקנוז) <sup>2</sup>	ריסוס	אוקטב +0.06% מרפאן 0.25%	עד נגירה	50
מנג	עיוות התפוחות <sup>3</sup> קימחון המנגו <sup>4</sup>	ריסוס	0.1%	200-100 ל"ד'	7
תות-שדה	גחלון (אנתרקנוז) <sup>5</sup>	טבילה של השתילים	0.2%	-	-
ורד	דיפלודיית הענפים	ריסוס	0.2%	עד נגירה	-
ציפורן	מגלת ורודה בגבעולים	ריסוס	0.2%	עד נגירה	-
קוכיה	פייחת בגבעולים ובעלים	ריסוס	0.2%	עד נגירה	-
מלפפון	מגלת המלפפון (פוזריום), גבעול זב (דידימלה)	הגמעה	0.1-0.2 ג' / צמח <sup>6</sup>	50 סמ"ק לצמח	3