



- 1 - הריכוז הגבוה בעגבניות מפותחות.
- 2 - הריכוז הנמוך בטיפול מניעה, מגדילים את הריכוז עם הופעת הנגיעות והתעצמותה.
- 3 - יעילות הטיפול מהאוויר נופלת מזו של הטיפול מהקרקע ויש לנקוט בו רק כאשר אין אפשרות לטפל מהקרקע.
- 4 - הריכוז הגבוה מומלץ בחלקות בהן הנגיעות בעבר הייתה גבוהה.
- 5 - ריסוס ראשון בראשית אוקטובר והשני בסוף דצמבר. ריסוסים נוספים, במידת הצורך, יינתנו בינואר-מרס.
- 6 - יש להתחיל לרסס במניעה לפני סגירת הנוף ולהמשיך ולרסס במירווח של 7-10 ימים (המירווח הגדול במניעה).
- 7 - בהתאם למעקבות הריסוסים המומלצת להדברת אלטרנריה. הריסוסים יינתנו במירווח של 14 יום.
- 8 - בשלב תרדמה ולא יאוחר מתחילת בצבוץ ירוק. בתפוח אין לרסס לאחר תחילת בצבוץ ירוק, ריסוס מאוחר יותר עלול לגרום לחספוס בכרי.
- 9 - באגס בתקופת הפריחה, הריסוסים יינתנו בריכוז 0.08% מתחילת הפריחה ויימשכו עד סיומה במירווח של 5-6 ימים.
- 10 - יש להתחיל ולרסס לפני הופעת המחלה (מניעה) במירווח של עד 7 ימים. עם הופעת המחלה יש לצופף את הטיפולים לפעמיים בשבוע. יש לשלב בתוכנית הריסוסים תכשירים נוספים מומלצים היעילים בהדברת הפטרייה כמו פוליו גולד + קורזייט, מנקור, סכור, קליפמן ועוד.
- 11 - במינון 100 יש לשלב שמן נימגארד בריכוז 2%.
- 12 - בהתאם לגודל הנוף.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 03/ה"צ/1721. מס' או"ם: 3077.  
 מאושר לשימוש בחקלאות האורגנית רשיון מס': 7342  
 מאושר כמתאים לסטנדרט האמריקני NOP מס': 11001



קוטל פטריות וחיידקים למניעת מחלות בצמחים

רעילות לחי במים:	התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים.
רעילות לדבורים:	רעילות בינונית לדבורים.
כניסה מחדש לשטח המטופל:	אין להיכנס לשטח המרוסס ללא הגנה מתאימה, לפני חלוף 24 שעות מהריסוס.
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

שילובים: כאשר משלבים תכשיר נוסף יש להוסיפו למכל המרסס רק לאחר הכנסה וערבוב של קוציד 2000. בחקלאות האורגנית מותר לשלב אך ורק תכשירים המאושרים לחקלאות אורגנית.

הוראות שימוש:

הגידול	המחלה	הריכוז או המינון	נפח התרסיס (ל'ד')	יישום אחרון / לפני אסיף / קטיף (ימים)
עגבנייה	ניקוד חיידקי	0.4%-0.25% <sup>1</sup>	50-30	
	כימסון הסולנייים <sup>11</sup>	200-100 (ג'ד')	50-30 <sup>12</sup>	
פלפל	גרב חיידקי	0.4%-0.25% <sup>2</sup>	50-30	
תפוח-אדמה	ריקבון רך חיידקי <sup>4</sup>	200 (ג'ד')	30-10	
	כימסון הסולנייים <sup>11</sup>	200-100 (ג'ד')	40-20 <sup>12</sup>	
מלפפון, מלון	דמיעה בדלועיים	0.25%	50-30	
גזר	קימחון הגזר, חלפת הגזר	200 (ג'ד')	40-10	
הדרים	קימלון (מאל-סקו)	0.25%	400-200	
	כתמי חלפת' (אלטרנריה)	0.25%	400-200	
	ריקבון חום	0.25%	200	
	ריקבון חום	ריסוס מהאוויר 800 (ג'ד') <sup>3</sup>	15	
	החמה	0.4%-0.16% <sup>4</sup>	400-200	
תפוח (עד בצבוץ ירוק)	חירכון <sup>8</sup>	0.25%	150-100	
אגס (עד בצבוץ ירוק)	חירכון <sup>8</sup>	0.25%	150-100	
אגס (כפריחה)	חירכון <sup>9</sup>	0.08%	150-100	
צ'ת	עין הטוסס <sup>5</sup>	0.25%	עד נגירה	
גפן	כשותית הגפן	0.25%	עד נגירה	
מנגו	השחרה חיידקית	0.25%	עד נגירה	
	השחרה חיידקית	ריסוס מהאוויר 480 (ג'ד') <sup>3</sup>	20	

7