



# אקנטו פלוס / אקאנטו בלוס / Acanto Plus

תרכיז רחוף, מכיל: 200 ג'ל/ל Picoxystrobin + 80 ג'ל/ל Cyproconazole



## קוטל פטריות להדברת מחוללי מחלות בעצי פרי נשירים ובגפן

**אקנטו פלוס** הינו קוטל פטריות סיסטמי משולב המכיל שני מרכיבים פעילים: פיקוקסיסטרובין – הממתיין לקבוצת הסטרובילורנים וציפרוקונזול מקבוצת הטריאזולים. שני המרכיבים הפעילים מקנים לתכשיר פעילות כפולה – מניעת נגיעות ע"י עיכוב נביטת נבגים ופעילות קורטיבוית הבאה לכלל ביטוי בעיכוב התפתחות תפסיר הפטריה.

**מי תהום:** אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן:

- (א) מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים;
- (ב) מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים;
- (ג) מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.

<b>אזהרות:</b>	עלול לגרום לנזק לעובר. השימוש אסור לנשים ולגברים בגיל הפוריות.
<b>רעילות לחי במים:</b>	התכשיר רעיל מאוד ליצורים החיים במים, עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית.
<b>רעילות לדבורים:</b>	אינו רעיל לדבורים כאשר מיושם בהתאם להמלצות.
<b>כניסה מחדש לשטח המטופל:</b>	מותרת לאחר התייבשות מלאה של טיפות התרסיס על נוף הצמחים.
<b>דרגת רעילות:</b>	מסוכן (IV)

**שילובים:** אין לשלב אקנטו פלוס בתכשירים נוספים.

**עמידות:** אין להשתמש באקנטו פלוס ברציפות, אלא כחלק ממשטר טיפולים חלופיים עם קוטלי פטריות אחרים מקבוצות כימיות שונות המומלצים למטרה זו. אין ליישם אקנטו פלוס יותר מ-2 יישומים בעונה.

### הוראות שימוש:

יש להתחיל לטפל לפני או מיד עם הופעת סימני נגיעות ראשוניים במחלה. הריסוסים יינתנו בכלי היישום המומלצים, בנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי נאות של נוף הצמחים.

הגידול	המחלה	הריכוז (%)	נפח התרסיס (ל'ד')	יישום אחרון לפני קטיף (ימים)
שקד	חלדון הגלעיניים	0.02	150-100	4
אפרסק, נקטרינה	חלדון הגלעיניים, קימחון האפרסק	0.02	להרטבה מלאה של העץ, בהתאם לגודל הנוף	3
אגס	גרב התפוח	0.03		7
גפן	קימחון הגפן	0.02		3

**הערות:** אין ליישם אקנטו פלוס יותר מפעמיים בעונה. המרווח בין הריסוסים 10-14 ימים.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 16/ה"צ/4270. מס' או"ם: 3082.

רשיון לשימוש בחקלאות אורגנית רשיון מס': 7059

