



נו-לור / נו-לור / Nu-Lure

תרכיז נוזלי, מכיל: 44% Corn Gluten Meal Hydrolyzed



קוטל חרקים. פיתיון לשילוב עם אקסירל להדברת זבוב הפירות הים תיכוני בהדרים וזבוב הזית בזית

נו-לור הינה פיתיון נוזלי המופק מתירס ומיועד לריסוס בשילוב עם קוטל החרקים אקסירל להדברה של זבוב הפירות הים תיכוני בהדרים וזבוב הזית בזית. בוגרי הזבוב (בעיקר הנקבות) נמשכים באופן חזק מאוד לפיתיון שהוא תמיסת מזון מרוכזת ונקטלים כתוצאה מחשיפה לחומר ההדברה. נו-לור אינו מכיל חומר הדברה.

רעילות לחי במים:	זיהום מקורות מים עלול להיות קטלני לדגים. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
רעילות לדבורים:	הפיתיון אינו רעיל לדבורים ולפרוקי רגלים מועילים אחרים.
מועד כניסה מחדש לשטח המטופל:	בהתאם להנחיות בתווית אקסירל.
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

הוראות שימוש:

היישום ייעשה מהאוויר או מהקרע. נער היטב את האריזה לפני השימוש. את הכמות המדודה של התנשיר שופכים למכל המרסס המלא כדי מחציתו מים, מוסיפים אקסירל בכמות המומלצת, מפעילים את הבוחש ומשלימים לנכח הנדרש. הקפד על ערבול מתמיד במהלך היישום. אין להלין תמיסה מוכנה ליום המחרת. אין ליישם נו-לור בשילוב אקסירל יותר משלש פעמים בעונה.

ניטור: חובה לנטר את רמת המזיק בחלקה באופן קבוע ושוטף לאורך כל תקופת הפעילות של הזבוב ועד לאחר הקטיף. הניטור ייעשה ע"י פקחים מיומנים. במקרה של עלייה ברמת הנגיעות בפירות מעל לסף המומלץ יש להקטין את המירווח בין הטיפולים או לרסס ריסוסי חיפוי בתנשיר מומלץ.

הגידול	המזיק	המינון	שיטת הריסוס	יישום אחרון לפני קטיף/מסיק (ימים)
הדרים	זבוב הפירות הים תיכוני	125 סמ"ק/ד' בשילוב עם אקסירל במינון 10 סמ"ק/ד'	מהקרע: כל שורה שנייה בנכח תרסיס של 2-3 ל"ד' בהתאם לגודל העצים. מהאוויר: פס כל 50 מ' בנכח תרסיס של 200 סמ"ק/ד'	ראה תווית אקסירל
זית	זבוב הזית	10 סמ"ק/ד'	מהקרע: כל שורה שנייה בנכח תרסיס של 1-3 ל"ד' בהתאם לגודל העצים	

מועד הטיפול: יש להתחיל בריסוסים עם תחילת פעילות של בוגרי הזבוב ולהמשיך במירווחים של 7-10 ימים עד לקטיף.

שילובים: שילוב בתנשירי נחושת עלול לכגום בעילות הפיתיון. יתרה מכך, יעילות הפיתיון עלולה להיפגע כאשר הוא מרוסס על רקע טיפול קודם בתנשירי נחושת.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 18/ה"צ/44. מס' או"ם: לא מסווג