



קוטל אקריות בפרחים, בירקות ובעצי פרי

הוראות שימוש:

נער היטב את אריזת התכשיר לפני השימוש.

הגידול	המזיק	המינון או הריכוז ונפח התרסיס	הערות	יישום אחרון לפני אסיף/קטיף (ימים)
פרחים: * ורד, ציפורן, סולידגו, אסטר, צלוזיה, לוע-ארי, גיבסנית, חמנית, סייפן, חרצית	אקרית אדומה מצויה	50 - 75 סמ"ק/ד' בנפח תרסיס של 50 עד 100 ל"ד/ד' או 0.05%-0.075% בנפח תרסיס גבוה מ-100 ל"ד/ד'. המינון או הריכוז הנמוך מומלצים ברמת נגיעות התחלתית נמוכה או כאשר נדרשים שני יישומים עוקבים בתכשיר.	יש להתחיל בריסוסים בסף נגיעות נמוך מיד עם הופעת האקריות בחלקה. בגידולים בהם העלווה צפופה או במקרים של נגיעות קשה ושילוב דורות של המזיק יש לחזור על הטיפול שנית כעבור 7 ימים.	-
	אקרית האסכרג	3		
ירקות: עגבניה, פלפל, חציל, מלפפון, אבטיח	אקרית אדומה מצויה	50 סמ"ק/ד' בנפח תרסיס של 50 עד 100 ל"ד/ד' או 0.05% בנפח תרסיס גבוה מ-100 ל"ד/ד'.	מאחר והתכשיר אינו סיסטמי יש לרסס בנפח תרסיס שיבטיח כיסוי מלא של העלווה וחדירה אל נוף הצמחים המרוססים. אין לרסס פלורמיט יותר מפעמיים בעונה.	7
	מלון			3
	תות שדה			7
	בצל ירוק			7
כרפס עלים				
צמחי תבלין**				
תפוח, אגס	אקרית אירופית, אקרית צהובה	0.06% בנפח תרסיס של 100-200 ל"ד/ד' בהתאם לגובה העצים		15
שזיף, נקטרינה	אקרית צהובה			14

פלורמיט הינו קוטל אקריות המיועד להדברת אקריות קורים בפרחים ובירקות הגדלים בחממות, בבתי רשת ובשטח הפתוח וכן להדברת אקרית צהובה ואקרית אירופית בעצי פרי. **פלורמיט** משתייך לקבוצה הכימית Carbazate. אתר פעולתו במערכת העצבים של האקריות. **פלורמיט** נקלט בגוף האקרית במגע וקוטל במהירות יחסית את הדרגות הנעות של האקריות. **פלורמיט** ניתן ליישום בכלי הריסוס המומלצים, המאפשרים כיסוי מלא של העלווה וחדירה מירבית אל הנוף הסבוך. אין לרסס את התכשיר בנפחי תרסיס נמוכים. כדי להפחית את הסיכון לפיתוח תנגודת, חשוב לנקוט בגישה של ריסוסים חלופיים בתכשירים המורשים לכך ובמירווחי הריסוס המומלצים. כמו כן יש להגביל את מספר הריסוסים ב**פלורמיט** לשני טיפולים בעונה בלבד. לעניין זה, 2 יישומים עוקבים ב**פלורמיט** במירווח של פחות מ-7 ימים נחשבים לטיפול יחיד בתכנית ההדברה. בעקבות טיפול ב**פלורמיט** יבואו במעקבות שני טיפולים חלופיים אחרים. **פלורמיט** רעילות נמוכה לאקריות טורפות ולחרקים מועילים והוא מתאים לריסוס בתכנית של הדברה משולבת (IPM).

רעילות לחי במים:	התכשיר רעיל ליצורים שוכני מים.
רעילות לדבורים:	במינונים המומלצים ובשיטות היישום המומלצות פלורמיט אינו רעיל לדבורים.
כניסה מחדש לשטח המטופל:	12 שעות לאחר סיום הריסוס.
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

שילובים: פלורמיט נבדק ונמצא בטוח בשילוב עם התכשירים הבאים: ורד: BB-5, ציפורן: ספיידר, סולידגו: אופיר, רובאל א"ר, אוואנט, טריגרד, גיבסנית: טריגרד, חמנית: טריגרד, סייפן: טריגרד, חרצית: אוואנט, עגבניה: מיתוס, סקור, פולאר, קליפמן, שביט, אוואנט, אוויסקט, אפולו, מץ', ספיידר, פגסוס 250, חציל: ספיידר, פלפל: אופיר, פולאר, שביט, אוואנט, אוויסקט, ורטימק, טלסטאר, מץ', ספיידר, פגסוס 250, מלפפון: ספיידר, פיראט, אבטיח: ספיידר, מלון: ספיידר. עם זאת בהתחשב בתנאים המיוחדים באזורים השונים ובמיגוון שיטות הגידול, חובה על המשתמש לבצע בדיקת כושר השתלבות ובטיחות מקדימה בקנה מידה מצומצם, לפני ביצוע הריסוס המשקי.



***פירוט רשימת תי הפרחים:** ורד: כרמן, פינק טנגו, רוזה אינדיקה, נובלס, פריסקו, סשה, למבדה, אספריט, באלט, ניקול, טיניקה, מורק, סובניר, גולדן גייט, רוול, בלק מג'ק, בל רוז, אנה וירג'יניה, לאונידס, בלק בקרה, ציפורן: ווייט דונה, טוארג, ליני, פמלה, לילה, טונדרה, מאלאגה, דונטלו, סולידגו: טרה, אסטר: קזבלנקה, סאן קרלו, סאן פלאם, סאן גאל, סאן טאי, דיאנה, קינג וייט, כחול שוליים, פרפל, צלוזיה: צ'יף, לוע ארי: פוטומק, וינטר לבן, גיבסנית: מיליון סטארס, פרפקטה, בלנקה נוויס, חמנית: אורית, ירושלים, סייפן: אמסטרדם, חרצית: קלבריה, רייגן, היי-פי, ריי-וינר, יוקו אונו, אלן ואן לאנגן, ביאריץ, בובי, טרהמטיק, דרורה, ריי-פוקוס, רמיקס, שינה, ציקס, בלינדה, דרמטיק, רד בינטי, אלגרו אורנג', ריפיקוס רד, בניג'ולינג, בריז, קלסיק.

****פירוט צמחי התבלין:** עירית, גד השדה (כוסברה), פטרוזיליה, שמיר, רוקולה, ריחן (בזיל), טרגון, נענע (מנטה), מרווה, קורנית, רוזמרין.