



מוסתי צמיחה לזירוז פתיחת הלקטים בכותנה

קוויק הינו מוסתי צמיחה הגורם לזירוז פתיחת הלקטים בכותנה. בעקבות הריסוס בקוויק יואץ קצב פתיחת ההלקטים הבשלים. אברי פרי לא בשלים בד"כ ינשרו, תיתכן גם נשירה מסוימת של עלים. שילוב קוויק עם דרופ אולטרה יגרום לזירוז פתיחת ההלקטים ולהאצה של תהליך השילוח. כאשר הריסוס הראשון לשילוח נעשה עם דרופ אולטרה בשילוב עם קוויק והריסוס השני, כעבור 7 ימים, נעשה בדרופ אולטרה לבד, תהליך השילוח נמשך בד"כ 10-14 ימים.

אזהרות:	מכיל אתפון המשתייך לקבוצת הזרחנים האורגניים ומעכב אצטיל כולין אסטראז. התכשיר קורוזיבי ועלול לגרום לנזק בלתי הפיך לעיניים וכן לגירוי בעור. קוויק הינו חומר חומצי. מנע מגע של התכשיר המרוכז או של התרסיס עם משטחים צבועים, בטון, חומרים אקריליים ומתכות. מגע ממושך עלול לגרום נזק. במקרה של מגע שטוף מיד במים.
רעילות לחי במים:	התכשיר רעיל לדגים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית.
רעילות לדבורים:	אינו רעיל לדבורים.
כניסה מחדש לשטח המטופל:	אין להיכנס לשטח המטופל ללא הגנה מתאימה לפני שחלפו 48 שעות ממועד הריסוס.
דרגת רעילות:	מסוכן לבריאות (II)

מועד הריסוס: לאחר שנפתחו לפחות 60% מההלקטים וההלקטים שעדיין סגורים ומיועדים להיקטף הינם במצב בשל.

שילובים: קוויק ניתן לשילוב עם דרופ אולטרה בשילוח הראשון, הריסוס המשולב יעשה מהקרקע בלבד. אסור לשלב עם מג או עם חומרים המכילים כלורטים.

הוראות שימוש:

הגידול	המטרה	המינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל"ד')
כותנה	זירוז פתיחת הלקטים	500	10-7 מהקרקע 5 מהאוויר
	זירוז פתיחת הלקטים והאצת השילוח	300* בשילוב עם דרופ אולטרה	

* בשילוב עם דרופ אולטרה במינון 60 סמ"ק/ד' בשילוח הראשון (מהקרקע בלבד).

מנע רחף של תרסיס לגידולים שכנים. קוויק עלול לפגוע בגידולי תרבות אחרים. הריסוס יבוצע בתנאים בהם אין משב רוח לגידולים שכנים, יש להתרחק לפחות 100 מטר מגידולים שכנים.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 01/ה'צ/1639. מס' או"ם: 3265.