



**מוסתי צמיחה לעיכוּב הבלבוב של בצל באיחסון**

רויאל מיועד לריסוס בבצל, לעיכוּב לבלבוב באחסון. **מועד הריסוס:** הריסוס ייעשה לאחר שהבצל הגיע להבשלה מלאה ולתחילת צניחה - כאשר העלווה עדיין ירוקה (רצוי במצב של 25% ועל כל פנים לא יותר מ-50% צניחה). אין לרסס בצל לפני שלב הצניחה. ריסוס מוקדם משבועיים לפני הבשלה עלול לגרום לבצל ספוגי. אין לרסס בצל שמרבית עלוותו התייבשה כתוצאה ממחלות, ממזיקים או מסיבה אחרת כלשהי, כיוון שלא תהיה קליטה והעברה של החומר לבצל. קליטת החומר תהיה יעילה כל עוד יש לבצלים לפחות 5 עלים ירוקים. טיפול ברויאל יעכב את ליבולו הבצל באחסון, אך מעבר לכך אין לו כל השפעה על כושר השתמרות הבצל. אין להשקות בהמטרה לפחות 24 שעות לאחר הריסוס, המטרה מוקדמת תפחית את יעילות התכשיר.

רעילות לחי במים:	התכשיר אינו רעיל ליצורים החיים במים.
רעילות לדבורים:	התכשיר אינו רעיל לדבורים.
מועד כניסה מחדש לשטח המטופל:	אין להיכנס לשטח המטופל ללא הגנה מתאימה לפני התייבשות התרסיס.
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

**הוראות שימוש:**

אין לרסס בצל המיועד לריבוי.

הגידול	המטרה	המינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל'ד')	הערות
בצל	עיכוּב הבלבוב באחסון	1200	50-40	הריסוס ייעשה מהקרקע ויבוצע בצורה שתבטיח כיסוי מלא ואחיד של העלווה. יש לרסס את התכשיר בשעות היום הקרירות, כאשר מעלות החום הן מתחת ל- 29 מ"צ.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 86/ה"צ/943. מסי או"ם: לא מסווג.

