



מוסתי צמיחה לפרחים

התכשיר **אלאר** הינו מוסתי צמיחה הפועל במערכת ההורמונלית בצמח. יעילות התכשיר מושפעת מגורמי סביבה שונים כגון: טמפרטורה, לחות, תאורה, דישון וזמינות מים. כמו-כן מותנית יעילותו של התכשיר במין הצמח, בזן, בקצב הצמיחה ובשלב הפנולוגי. לכן חלה חובה על המשתמש לערוך ניסוי מקדים בתנאי הגידול הייחודיים במשקו, כדי לקבוע את העיתוי והריכוז המדוייק בתחום הריכוזים המצוינים בטבלה.

אזהרות:	לשימוש בגידולים לא אכילים. נמצא גורם לגידולים בחיות מעבדה.
רעילות לחי במים:	רעילות נמוכה ליצורים החיים במים.
רעילות לדבורים:	רעילות נמוכה לדבורים.
כניסה לשטח המטופל:	בחלוף 24 שעות מהריסוס.
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

הוראות שימוש:

הגידול	מועד היישום	הריכוז (%)	נפח התרסיס (ל'ד')	הערות
חרצית: לגידול פרחים קטופים	ריסוס 1: תוך 7 ימים מתחילת משטר היום הקצר. ריסוס 2: במידת הצורך, כ-3 שבועות מאוחר יותר. ריסוס 3: בעונת הקיץ, בזנים בעלי עוקצי פרחים ארוכים, כאשר מופיעים פקעי הפריחה.	0.3	50-30 לכיסוי מלא של קודקודי הצמחים	בחלקות המיועדות לטיפול באלאר, יש להתחיל את משטר היום הקצר מאוחר יותר, כאשר הגבעול ארוך ב-5 ס"מ מהמקובל.
חרצית: ייצור יחורים במטע-אם	ריסוס כל 7 ימים	0.1-0.05 (הריכוז הגבוה בזנים בעלי צימוח נמרץ)		

הגידול	מועד היישום	הריכוז (%)	נפח התרסיס (ל'ד')	הערות
גידול בעציצים: חרצית	ריסוס 1: 10 ימים לאחר הקיטום, או כאשר הפריצות באורך 2.5-4 ס"מ. ריסוס 2: במידת הצורך, כ-3 שבועות מאוחר יותר.	0.3-0.2		בזנים בעלי צימוח נמרץ, אפשר לרסס ריסוס נוסף במידת הצורך.
גלוקסיניה	לאחר העברה לעציץ הסופי ולפני תחילת התארכות הגבעולים.	0.1		
גרדניה	לאחר קיטום היחורים. ריסוסים נוספים במידת הצורך, אך לא יותר מ-2 טיפולים.	0.7-0.35		כתוצאה מהריסוס באלאר, העלים מקבלים גוון כהה יותר ומתקבלת הקדמה בהופעת פקעי הפריחה
הדרנגיה	טיפול קייצי: 4 שבועות לאחר קיטום. טיפול חורפי: עם תחילת התפתחות ענפי הפריחה.	0.8-0.6	ריסוס להרטבה מלאה של נוף הצמחים	בקיץ יש לרסס פעמים נוספות במידת הצורך.
היפואסטס	14-7 ימים לאחר העתקה לעציץ הסופי	0.35-0.45		
ניצנית	לאחר הקיטום, בתדירות של אחת לשבועיים	0.6		הטיפול באלאר מעכב את הפריחה בכ-7 ימים.
פיטוניה (גידי הכסף)	14-7 ימים לאחר העתקה לעציץ הסופי	0.25-0.35		
צינוריה	לאחר היווצרות פקעים או לפני התארכות גבעול הפריחה	0.3		
גידולי שתיל: גוש: פיטוניה, ורונה, וינקה, טגס, ציפורני-חתול	3-2 שבועות לאחר העתקה לעציץ הסופי.	0.5-0.3		

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 08/ה"צ/1978. מס' או"ם: לא מסווג.

