



ג'יברלוון / چبرلون / Giberllon

תרכיז נוזלי, מכיל: 40 גרם בליטר Gibberellic Acid (כל 25 סמ"ק ג'יברלוון מכילים 1 גרם חומר פעיל)



מוסת צמיחה בגפן, בהדרים, באפרסמן, באגס, בקינרס, בגיבסנית

לבדוק אריזה 10-200



רעילות לחבי במים:	ה騰סיר אינו רעל ליצורים חיים במים.
רעילות לדבורים:	ה騰סיר אינו רעל לדבורים.
מועד ניסיה מחדש לשיטה המתופל:	אין להזכיר שדה מושס לא הגנה מתאימה עד להתייששות המטריס.
דוגמת רעלות:	מסוק (A)

הוסף משטח רק באזם מקרים שהדבר יצוין במדויק. הריסוס חייב להיעשות בסמן להכנת התריסים.
אין להשנות את המרטיסים ליום המחרת.

הוראות שימוש:

הgidול	המטרה	מועד הטיפול	הרכיב (ח'פ'')	כמות ה騰סיר ל-100 מ'ם	משענחים ושלובות בריכוז מנפח המרטיס	נקח המרטיס
גפן ב津נים: פרלט, סולטניה	פרלט : דילול האשכול והגדלת הגנגר סולטניה: דילול הашכול והגדלת הגנגר	1.1 90-100 פריחה 2. בגמר חנטה 3. 7 ימים לאחר מacen	20-15 40-30 40-30	50-37.5 סמ"ק 100-75 סמ"ק 100-75 סמ"ק	טריטון 100-X 0.025%	הרובתה מלאה
ולנסיה	הנברת חנטה	1.1 50% פריחה 2. 70-80 פריחה 3. בפריחה מלאה 4. לאחר גמר חנטה ולאחר מacen 2-3 ריסוסים נוספים במרווח של 4-6 ימים	20-15 20-15 30 40-30	50-37.5 סמ"ק 50-37.5 סמ"ק 75 סמ"ק 100-75 סמ"ק	טריטון B-1956 0.025% טריטון או 0.05% BB-5	
פומליה הירוק	שמירת הצבע	רישום באוגוסט-ספטמבר, ניתן לריסום שנייה כחודש לאחר מacen	10-5 או 5	25-12.5 סמ"ק	טריטון B-1956 0.025% טריטון 0.1% + 0.1% + 0.04% L-77 או שםן קייזי 1.75%	12-15 ליטר לערך
טינאולה	שמירת מזקוקם והפחחת קמטת	רישום באוגוסט	10	25 סמ"ק	טריטון B-1956 0.025% טריטון 0.1% +	
אשכולית פומליה	הארכת עונת הקטיף והפחחת קמטת	רישום לפני שבירת צבע (אוקטובר), טיפול יחיד	10-5 או 5-2	25-12.5 סמ"ק	טריטון B-1956 0.025% טריטון 0.1% + 0.1% + 0.05% BB-5 + 2,4-D + 18%	
אשכולית, פומליה	הארכת עונת הקטיף	רישום באוקטובר - דצמבר	10-5	25-12.5 סמ"ק		
	שמירת פרי בzechzon	רישום בمعרך האריזה במשולב בדונג	50	250 סמ"ק ב-200 ליטר דונג		