

יוניק / يونيك / Unik

תרכיז נוזלי, מכיל: 50 גרם בליטר Uniconazole



מוסטת צמיחה באבוקדו ובפרחים

יוניק הינו מעכב סינתזת ג'יברלין, מבקר את רמת גידול הצמח, רמת הביומסה וגודל הפרי

רעילות לחי במים:	רעיל מאד ליצורים החיים במים עם השפעות ממושכות
רעילות לדבורים:	התכשיר אינו רעיל לדבורים
כניסה לשטח המטופל:	מיידי
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

הוראות שימוש:

הגידול	הזן	הריכוז (%)	נפח התרסיס (ל'ד')	השילוב	מועד הריסוס
אבוקדו	אטינגר	0.7	100-75	אוריאה פוספט 50 בריכוז 2%	לפי המלצות מערכת ההדרכה ובהתאם להערה מטה
	פינקרטון	0.2 + 0.7			
	האס	0.8			
	פוארטה	1			

בזן אטינגר:

א. ריסוס בודד: יוניק 0.7% במועד שיא פריחה מאחר.

ב. ריסוס מפוצל:

1. במועד שיא פריחה מאחר: יוניק 0.35% + אוריאה פוספט 50, 2%.

2. במועד סוף פריחה: יוניק 0.35% + משטח אניוני

אם יש הבדל בעייתי הפריחה בין שני צידי השדרה - יש לרסס כל צד בנפרד

בזן פינקרטון: ריסוס מפוצל:

1. במועד שיא פריחה מקדים: יוניק 0.7% + אוריאה פוספט 50, 2%.

2. במועד סוף הפריחה: יוניק 0.2% + משטח אניוני



הגידול	מועד הטיפול	צורת היישום	הריכוז/המינון	נפח תרסיס (ל'ד')	הערות
צמחי עציץ במשתלות צמחים עשבוניים כגון: סולנום, סקיבולה, פלרגוניום אחר, חרצית, צפורן סינית.		ריסוס	0.04%-0.01%	100	המינון ייקבע בכל מין לפי הניסיון המקומי
דלת בעציצים		ריסוס	0.2%-0.1%	100	
שדף יפני מבוגר	באביב בפריחה מלאה עד תחילת חנטה	טיפול קרקע מתחת לטפטפת בזמן ההשקיה	2-3 סמ"ק לעץ בשנה ראשונה. 1-2 סמ"ק לעץ בשנים הבאות לפי צימוח		אין לטפל בעצים חלשים וללא עלים. אין לטפל יותר מפעם בשנה.
בוגנוויליאה	תחילת צימוח אביב	ריסוס	0.3%	הרטבה מלאה	