



## מוסטת צמיחה בבצל

הימלאיה הינו מוסטת צמיחה סיסטמי החוסם את חלוקת התאים בצמח. השימוש בהימלאיה מיועד לעכב את הנצת הבצל באחסון.

רעילות לחי במים:	התכשיר רעיל לדגים וליצורים החיים במים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. אין ליישם את התכשיר דרך מערכת ההשקיה.
רעילות לדבורים:	התכשיר אינו רעיל לדבורים.
כניסה לשטח המטופל:	לאחר התייבשות התרסיס.
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

## הוראות שימוש:

הגידול	נפח התרסיס (ל"ד)	המינון (סמ"ק/ד')	מועד הריסוס*
בצל	30	800	בצל בוגר לאחר הבשלה

הערות: אין לרסס בצל לריבוי

\*מועד הריסוס: הריסוס ייעשה לאחר שהבצל הגיע להבשלה מלאה, ונראית תחילת צניחה (רצוי 25% צניחה אך לא יותר מ 50% צניחה). אין לרסס לפני תחילת הצניחה, ריסוס - מוקדם של יותר משבועיים לפני הבשלה עלול לגרום לבצל ספוגי. טיפול בהימלאיה יעכב את לבלוב הבצל באחסון אך אין לו השפעה על כושר השתמרות הבצל. אין להשקות בהמטרה 24 שעות לאחר הריסוס, הרטבה תפחית את מיעילות התכשיר.

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 05/ה"צ/1844. מס' או"ם: 3082

