



ליבפר / ליפטר / Libfer®

אבקה מסיסה, מכיל: כילאט ברזל, (FeEDDHA) 6%

BASF
The Chemical Company

20
ק"ג

כילאט ברזל לריפוי כלורוזה ומחסורי ברזל בעצי פרי, בגפן, בירקות ובאגוזי אדמה

ליבפר הינו מקור ברזל זמין לצמח ליישום דרך הקרקע. רצוי לדשן בליבפר באביב או בקיץ, כדי לספק לצמח ברזל זמין בתקופת הגידול. דישון בליבפר יתן תוצאה מירבית כאשר לצמח יש אספקה נאותה של מים ותכשירי הזנה.

רעילות לחי במים:	אינו רעיל לדגים, אך אין ליישם אותו ישירות לבריכות דגים או למקורות מים.
רעילות לדבורים:	אינו רעיל לדבורים
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

הוראות שימוש:

ניתן ליישם ליבפר באמצעות מערכת ההשקיה, בחריץ הזריעה או בהזרקה לאזור בית השורשים לפני השקיה. אם מרססים ליבפר על פני הקרקע, חשוב להצניעו ע"י המטרה זמן קצר לאחר הדישון. המינון של ליבפר תלוי בדרגת ההצהבה, בריכוז הגיר בקרקע ובגודל הצמח.

הגידול	המינון	הערות
אגוזי אדמה	בנגב הצפוני 0.5-1.0 ק"ג/ד', בבית שאן 1-1.25 ק"ג/ד', באזורים אחרים בהתאם לצורך	1-3-4 מנות
מלפפון	0.5-0.6 ק"ג/ד'	חוזרים על הטיפול מדי 2-3 שבועות לפי הצורך.
אבוקדו	5-10 גר' לעץ	יש להתחיל בטיפול באביב עם תחילת הבלבוב, ולחזור עליו כל 10 עד 14 ימים, עד לריפוי הצהבון.
אפרסק, תפוח, אגס	0.5-0.6 ק"ג/ד'	טיפול ראשון באביב, טיפול נוסף בסוף הקיץ.
קיווי	0.5-0.6 ק"ג/ד'	יש להתחיל בטיפול באביב עם תחילת הבלבוב ולחזור עליו כל 10 עד 14 ימים עד לריפוי הצהבון.
הדרים	20 גר' לעץ מגיל 5 ומעלה	במידת הצורך חוזרים על הטיפול כעבור 6 שבועות.
מנגו	2 ק"ג/ד'	
גפן	30-50 גר' לשיח	

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 81/ה"צ/464.
מספר או"ם: לא מסווג.

