




סימוקסן / סימוקסין / Cymoxan

גרגרים רחיפים, מכיל: Cymoxanil 60%



קוטל מחוללי מחלות בסולניים

סימוקסן הינו תכשיר סיסטמי קצר פעולה המדביר את מחולל מחלת הכימשון בתפוח אדמה ובעגבנייה. המרכיב הפעיל סימוקסניל, נקלט במהירות תוך כשעה בעליו ובגבעולים של הצמחים המרוססים, משלב זה מוגן התכשיר משטיפה ע"י גשם או ע"י המטרה. **סימוקסן** מדביר את מחולל מחלת הכימשון גם לאחר חדירתה לצמח עוד לפני הופעת תפטיר.

רעילות לחי במים:	רעיל ליצורים החיים במים, עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח לסביבה מימית.
רעילות לדבורים:	התכשיר רעיל לדבורים, יש לסגור כוורות לפני הריסוס ועד 3 שעות לאחר גמר הריסוס. אין צורך להוציא כוורות משטח היישום.
כניסה מחדש לשטח המטופל:	12 שעות. לאחר ריסוס בבתי צמיחה או במנהרות עבירות יש לאפשר אוורור נוסף של 12 שעות ע"י הפשלת יריעות הפלסטיק או הפעלת מאווררים.
דרגת רעילות:	מסוכן לבריאות (III)

הוראות שימוש:

הריסוסים יינתנו בנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי נאות וחדירה מירבית לנוף הצמחים בכלים המאושרים לכך. **סימוקסן** ניתן ליישום תחת חיפוי ובשטח הפתוח

הגידול	המחלה	המינון* (ג'ד')	נפח התרסיס** (ל'ד')	שילובים	יישום אחרון לפני אסיף/קטיף (ימים)
תפוח אדמה עגבניה	כימשון הסולניים	60-80 בשי" לוב עם קוטל פטריות נוסף	50-20	נוגל	12
			100-20		3

* מרססים במינון הנמוך בטיפול מניעה או כשרמת הנגיעות נמוכה.
** יש לרסס בנפח תרסיס שיבטיח כיסוי נאות של העלווה והפירות. נפח תרסיס גבוה מיועד לשטחים בהדליה.

מרווח ריסוסים: 5-10 ימים בהתאם לרמת הנגיעות. אין לרסס יותר מ-7 פעמים בשנה. רגיש לפרוק בתנאים בסיסיים (pH גבוה מ-7) ולכן אין לשלב עם קוטלי פטריות בסיסיים.

אין לרסס סימוקסן לבד. מיועד לריסוס בשילוב קוטל פטריות נוסף המתאים לכך.

רישיון השרותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 14/ה"צ/4184. מס' או"ם: 3077.

