

עמירן / عميران / Amiran

תרכיז רחף, מכיל: 250 גרם בליטר Azoxystrobin



אופן היישום: יש להזריק את התכשיר מהול במים למערכת הטפטוף במערכת השקיה מנותקת אייר. יש ליישם במשאבת דישון בהשקיה של 2-4 מטר מעוקב לדונם לאורך כל ההשקיה. לאחר היישום יש להזרים 1 מטר מעוקב מים לדונם לשיטפת המערכת. השימוש עלול לגרום לסימני מחסור בעלים. הטיפול הינו טיפול מניעה בלבד. **עמירן** אינו יכול לשמש כתכשיר הדברה בודד להדברת המחלה לעונה כולה. אין ליישם במצע מנותק. אין ליישם בעת עקה (מים, אקלים ואגרזטכניקה). אין להצמיא את הצמחים לפני או אחרי היישום. התכשיר בהגמעה אינו מהווה חלק במשטר ההשקיה.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 15/15/4199/צ"מ. מס' או"ם: 3082.

קוטל פטריות להדברת מחלות עלווה וקרעק בירקות ובגזר

קוטל פטריות סיסטמי וטרנסלמינרי מקבוצת הסטרובילורינים, המדביר מחוללי מחלות בגזר, בתפוח אדמה, בעגבייה, בפלפל, בצל ובגפן. **עמירן** מעכב את נשימת הפטריות הפתוגניות ולפיכך הוא מתאים לשימוש לחלופין עם תכשירים בעלי מנגנוני פעולה אחרים.

רעילות לחי במים:	התכשיר רעיל ליצורים שוכני מים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית.
רעילות לדבורים:	התכשיר אינו רעיל לדבורים
כניסה מחדש לשטח המטופל:	4 שעות לאחר הריסוס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש בנוסף לאזורר בשיטות המקובלות עוד 12 שעות לפני הכניסה מחדש.
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

הערה: אין ליישם חומר זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן:

- א. מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים
- ב. מאשדוד עד קיסריה בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים
- ג. מחיפה - קרית עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים

הוראות שימוש:

הגידול	הנגע	המינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל'ד')	יישום אחרון לפני קטיף/אסיף/בציר (ימים)	הערות
עגבייה ⁽¹⁾ פלפל	קמחונית	150	בהגמעה	7	2 יישומים בלבד בעונה בהפרש של חודש ימים. טיפול ראשון מומלץ כחודש לאחר השתילה
	קמחונית	150	בהגמעה	7	
תפוח אדמה ⁽²⁾	מק-שורש ונימור שחור (ריזוקטור ניה)	100 סמ"ק ל-1000 מטר רץ גדודית	25	90	טיפול בפס הזרעה, במהלך זריעה
גפן	כשותית הגפן	0.05%	בהגמעה	15	טיפול מניעה
גזר ⁽³⁾	חלפת הגזר	50-25	35-20	15	טיפול מניעה או בשלב מוקדם של הופעת המחלה במינון נמוך
צל ⁽¹⁾	כשותית הצל, כימשון השקעים (סטמפי-ליום)	50	30-20	15	

(1) יש להקפיד על מירווחים של 7-10 ימים בין טיפול לטיפול.

(2) זנים: ניקולה, מונדיאל, קליאסטר, אומיה, וולור.

(3) טיפול מונע במינון הנמוך.

