




דלפין / دیلفین / Delfin

גרמים רחיקים מכיל: 32,000 יחידות בינלאומיות (53,000 יחידות ספודופטרה) במ"ג תכשיר של בצילוס תורנינגיינזיס ברלינר, תת-מין: קורטקי, סרוטייפ: 3a, 3b

CERTIS



הגידול	המזיק	מועד הטיפול	המינון או הריכוז	נפח התרסיס (ל"ד')	שיטת היישום	המירווח בין הריסוסים	יישום אחרון לפני קטיף/בציר (ימים)
אורן	תהלוקן האורן	מאמצע נובמבר ועד סוף דצמבר, עם בקיעת הזחלים	0.075%	100	ריסוס רובים	ריסוס יחיד בעונה	-
			70 ג'ל'	5-3	ריסוס מהאוויר		

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 93/ה"צ/1254. מס' או"ם: לא מסווג. רשיון לשימוש בחקלאות אורגנית רשיון מס': 7458



קוטל חרקים בירקות, בגפן ובאורן

דלפין הינו קוטל חרקים, המבוסס על רעלן המופרש ע"י החיידק בצילוס תורנינגיינזיס. התכשיר פועל כרעל קיבה ואתר פעולתו מצוי בדופן המעי של מערכת העיכול של החרקים הרגישים. הפסקת התנועה והתזונה חלות מספר שעות לאחר חדירת התכשיר לגוף החרק. זחלי העשים הרגישים לתכשיר נקטלים בתוך 3 ימים ממועד הריסוס. ככל שהזחלים צעירים יותר בעת היישום, תוצאות ההדברה המושגות תהיינה טובות יותר.

שילובים: אין לשלב דלפין בחומרים אחרים.

אחסון: הקפד על אחסון במקום קריר, יבש ומאוורר באריזה המקורית, כשהיא סגורה היטב. הקפד שהטמפרטורה במחסן לא תעלה על 25°C כדי לא לגרום לפירוק מואץ של התכשיר. חיי מדף בתנאי האחסון המומלצים – שנתיים.

דלפין אינו פוגע בחרקים מועילים.	סכנות לסביבה:
רעילות נמוכה לעופות.	רעילות לעופות:
רעילות נמוכה ליצורים החיים במים.	רעילות לחי במים:
אינו רעיל לדבורים.	רעילות לדבורים:
התכשיר אינו רעיל לבעלי דם חם ומותר לרסס בו עד מועד הקטיף.	טיפול אחרון לפני קטיף:
אין להיכנס לשטח המטופל בתכשיר אלא לאחר התייבשות התרסיס ע"ג העלוזה.	כניסה מחדש לשטח המטופל:
מסוכן (IV)	דרגת רעילות:

הוראות שימוש:

הגידול	המזיק	מועד הטיפול	המינון או הריכוז	נפח התרסיס (ל"ד')	שיטת היישום	המירווח בין הריסוסים	יישום אחרון לפני קטיף/בציר (ימים)
ענביה	פלוסיה	החל מהבקיעה ומהופעת הזחלים	75-50 ג'ל' בהתאם לגודל הזחלים ולרמת הנגיעות	50-15 בהתאם לגודל הנוף	ריסוס קרקע	בהתאם להתחדשות הנגיעות	
כרוב, כרובית	עשית המצליבים (עש הכרוב)	יש להתחיל בטיפול על פי ניטור המזיק ברמת נגיעות נמוכה	250 ג'ל'	50-30	ריסוס קרקע	7-10 ימים	3
גפן	עש פרי האשכול (עש האשכול)	לאחר החנטה, החל מבקיעה ומהופעת הזחלים או בהתאם לניטור באמצעות מלכודות כרומון	0.1%	200-100 כדי כיסוי מלא של האשכולות	ריסוס מפוח או ריסוס רובים	אחת ל-10 ימים	