

עמירן

أميران Amiran

תרכיז רחיק

מכיל: Azoxystrobin 250 gr/L

להדברת מחלות עלווה וקרקה

רעילות: IV מסוכן

מספר או"ם: 3082

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

מרחב אגרו

MERHAV AGRO



המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500
טל': 08-6308000, פקס: 08-6308001
www.gadotagro.co.il

היצרן: Sinon Corporation Taiwan, טאיוואן
רישיון השירותים להגנת הצומח: 15/ה"צ/4199

מספר סדרת ייצור:

Batch:

תכולה: 5x4 ליטרים

עמירן

أميران Amiran

תרכיז רחיף

מכיל: Azoxystrobin 250 gr/L

להדברת מחלות עלווה וקרקע

רעילות: 04 מסוכן

מספר או"ם: 3082

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

מרחב אגרו
MERHAV AGRO 

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500
טל': 08-6308000, פקס: 08-6308001
www.gadotagro.co.il

היצרן: Sinon Corporation Taiwan, טאיוואן
רישיון השירותים להגנת הצומח: 4199/ה"צ/15

מספר סדרת ייצור:

Batch:

תכולה: 5 ליטרים

כללי: קוטל פטריות סיסטמי וטרנסלמינרי מקבוצת הסטרובילורנים. מדביר מחלות צמחים. עמירן מעכב את נשימת הפטריות הפתוגניות ולפיכך הוא מתאים לשימוש לחלופין עם תכשירים בעלי מנגנוני פעולה אחרים.

הוראות שימוש:

אזהרות: מסוכן בבליעה. עלול לגרום לגירוי בעיניים ובעור. עלול לגרום בנשימה לגירוי באף ובגרון.

אמצעי זהירות ומיגון: יש להקפיד על אמצעי הזהירות המקובלים בטיפול בתכשירי הדברה להלן: שימוש בבגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות, כובע לכיסוי

אזהרות לסביבה: עלול לגרום לגירוי בעיניים ובעור. עלול לגרום בנשימה לגירוי באף ובגרון.

רעילות ליצורים החיים במים: התכשיר רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות, מנע זרימה ורחף לכריכות דגים ולמקורות מים.

רעילות לדבורים: התכשיר אינו רעיל לדבורים.

טבלת מינונים:

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד' או הריכוז)	נפח התרסיס (ל'/ד')	יישום אחרון לפני אסוף/קטיף/ בציר (ימים)	הערות
גזר (2)	קימחון הגזר	50-25	35-20	15	טיפול לפני הופעת המחלה או בשלב מוקדם של ההופעה במינור הנמוך
	חלפת הגזר	25			
תפוז	ריזוקטוניה (נימור שחור)	100 סמ"ק ל-1,000 רץ גזזית	25	90	טיפול בפס הזריעה, במהלך הזריעה
עגבנייה (1)	קימחונית	150	בהגמעה (3)	7	2 יישומים בלבד בעונה בהפרש של חודש ימים. טיפול ראשון מומלץ כחודש לאחר שתילה
	קימחונית	150	בהגמעה (3)	7	
בצל (1)	כשותית הבצל/כמסון השקעים (סטמפיליום)	50	30-20	15	
גפן	כשותית הגפן, קימחון גפן	0.05%	הרטבה מלאה	15	טיפולי מניעה

1. יש להקפיד על מירווחים של 7-10 ימים בין טיפול לטיפול. אין לרסס עמירן עד 21 יום לאחר השתילה.

2. טיפול מונע במינון הנמוך.

3. טיפולי הגמעה:

- א. טיפולי מניעה בלבד. אין לראות בעמירן כתכשיר בודד להדברת המחלה לעונה כולה.
- ב. אין ליישם במצע מנותק.
- ג. אין ליישם בעת עקה (מים), אקלים ואגרנטניקה.
- ד. אין להצמיא את הצמחים לפני או אחרי היישום ואין לראות ביישום התכשיר בהגמעה כחלק ממשטר ההשקיה.
- ה. יש להזריק את התכשיר מהול במים למערכת הטפטוף במערכות השקיה מנותקות אוויר. יש ליישם במשאבת דיזון בהשקיה של 2-4 מ"ק לדונם לאורך כל ההשקיה.
- ו. לאחר היישום יש להזרים 1 מ"ק מים לדונם לשטיפת המערכת.
- ז. עלול לגרום לתסמיני מחסור בעלים.

הכנת התרסיס: יש לנער היטב את המכל לפני השימוש. מוזדים את הכמות הדרושה של עמירן ומערבבים עם מעט מים, שופכים בהדרגה למכל הריסוס המלא במחצית כמות המים הדרושה, תוך כדי בחישת המערבל, ומוסיפים את יתרת המים.

הערה: אין ליישם חומר זה באזור שפלת החוף, כמפורט להלן:

א) מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו המים.

ב) מאשדוד עד קיסריה בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו המים.

ג) מחיפה - קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו המים.

בגמר השימוש:

טיפול בהגמעה: הטיפול הינו טיפול מניעה בלבד. עמירן אינו יכול לשמש כתכשיר הדברה בודד להדברת המחלה לעונה כולה. אין ליישם במצע מנותק. אין ליישם בעת עקה (מים, אקלים ואגרנטים). אין להצמיא את הצמחים לפני או אחרי היישום. יישום התכשיר בהגמעה אינו מהווה חלק ממשטר ההשקיה.

אופן היישום: יש להזריק את התכשיר מהול במים למערכת הטיפול במערכת השקיה מנותקת אויר. יש ליישם במשאבת דישון בהשקיה של 2-4 מטר מעוקב לדונם לאורך כל ההשקיה. לאחר היישום יש להזרים 1 מטר מעוקב מים לדונם לשיטפת המערכת. השימוש עלול לגרום לסימני מחסור בעלים.

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: אחרי הריסוס יש להתרחץ במים ובסבון ולהחליף בגדים. יש לכבס בנפרד את בגדי העבודה.

מועד כניסה מחדש: 4 שעות לאחר הריסוס. בבתי צמחיה ובמנהרות עבירות יש לאורר בנוסף, בשיטות המקובלות עד 12 שעות לפני הכניסה מחדש.

אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במקום קריר ויבש. יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת. יש להספיגו בחול או בנסורת, לאסוף לכלי אטום, ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפים למכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך לאשפה או לאתר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע בעיניים או בעור, יש לשטוף במים זורמים במשך 15 דקות לפחות. במקרה של בליעה יש לפנות לרופא ולהציג בפניו תווית זו.

מידע לרופא: המרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות.

ביה"ח רמב"ם חיפה, טל': 04-7771900.

לתשומת לב: היצרן והמשווק של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו על סמך העבודות בהן נוסה המכשיר ובתנאי שנמכר באריזתו המקורית. אולם כיוון שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, ע"פ הוראות היישום בתווית ולפי כל אופן שימוש אחר.