06.06.21 Saifan_250cc_19.8x12.5cm

GADOT Agro

סייפן

Saifan سيفان

תרכיז רחיף SC
קוטל חרקים סיסטמי
המיועד ליישום בריסוס
ובהגמעה

מכיל: IMIDACLOPRID 350 g/L

תכולה:
500 סמ"ק

your field at it's best

משווק ע"י: גדות אגרו בע"מ
GADOT Agro
המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

מיוצר ע"י:
Dor.Ky D&D Ltd.
דור.קי פיתוח ושיווק בע"מ
www.Dorky.co.il

עידכון תווית: 06/2021 | 0005000067101515

תוצרת ישראל

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس لالستخدام املنزلي - لالستخدام الزراعي فقط

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III) **מס' או"ם:** 3082
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 07/ה"צ/1882

כללי: סייפן הינו קוטל חרקים סיסטמי מקבוצת הניאוניקוטינואידים, המיועד להדברת כנימות עלה, ציקדות, עש מנהרות ההדר וכנימת עש הטבק. התכשיר פועל על המזיק כרעל קיבה וכרעל מגע.

אזהרות: מזיק בבליעה ובמגע. חשיפה חוזרת במגע בעור עלולה לגרום לתגובה אלרגית.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן היישום לבש בגדי עבודה ארוכים עמידים לכימיקלים, נעלי עבודה גבוהות, כפפות גומי (תקן EN-374/3), משקפי מגן עם מגני צד (EN-166), מסיכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3. מנע מגע של התכשיר המרוכז או של התרסיס עם העור או עם העיניים. אל תשאף את אדי התכשיר או את התרסיס. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

סכנות לסביבה:

רעילות ליצורים החיים במים: רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.

רעילות לדבורים: התכשיר רעיל מאוד לדבורים. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה. ניתן להכניס דבורים לחלקה רק שבועיים לאחר הטיפול. יישום בריסוס - פוגע בדבורים, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.

הכנת התרחיף: בהגמעה, יש לנער היטב את המכל לפני השימוש. יש להגמיע את הכמות הרצויה לאחר שדוללה במים ביחס של 1:2, באזור בית השורשים, בשליש השני של ההשקיה. היישום בהגמעה ייעשה רק במערכת מנותקת אוויר. **בריסוס**, יש לנער היטב את המכל לפני השימוש. מודדים את הכמות הדרושה של סייפן ומערבבים עם מעט מים, שופכים בהדרגה למכל הריסוס המלא במחצית מכמות המים הדרושה, תוך כדי בחישת המערבל ומוסיפים את יתרת המים.

אופן היישום: בהגמעה, יש ליישם על שטח נקי מעשבים. אין ליישם יותר מאשר פעמיים בעונה ובמירווחי זמן שאינם קטנים מחודש. במקרה של יישום בהגמעה, חובה להתקין 2 שסתומי אל חזור לפני נקודת החיבור לכניסת התכשיר לקו ההשקיה. קו ההשקיה יהיה קו סגור ללא המשך לגידולים נוספים. יש לנקז את המערכת ואת קו ההשקיה בסיום היישום. כולל קצה המערכת. המינון כמפורט בטבלה. היישום ייעשה כטיפול מניעה או כטיפול תגובה. במקרים של נגיעות מתקדמת, יש לחזור על הטיפול בהתאם לרמת הנגיעות, אך לא לפני הזמן המצויין בטבלה עבור כל גידול.

שילובים: אין לשלב עם תכשירים אחרים.

בגמר השימוש:

ניקוי מכל ההגמעה/המרסס: בגמר היישום יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המכל וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות המאושרות ע"י המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: לאחר גמר העבודה החלף בגדים והתרחץ היטב במים ובסבון. את בגדי העבודה יש לכבס בנפרד משאר הכבסים.

אחסון: שמור את התכשיר באריזה המקורית, במקום מוגן, נעול ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. הרחק את התכשיר ממזון וממספוא.

מועד כניסה מחדש לחלקה שטופלה: לאחר 24 שעות.

כניסה לחממות: בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לספוג בחול או בנסורת ולאסוף באמצעות מטאטא ויעה לכלי סגור ולפנות לאתר פסולת רעילה. לתכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: אריזה שהתרוקנה, שטוף היטב לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים, שפוך את התשטיף אל מכל ההגמעה או מכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה לפח האשפה.

עזרה ראשונה: • במקרה של בליעה - אין לגרום להקאה. יש לשטוף את פיו של הנפגע ואח"כ להשקותו במים. אין להשקות נפגע חסר הכרה • במקרה של שאיפה - פנה את הנפגע למקום מאוורר ופנה לקבלת טיפול רפואי • במקרה של מגע בעור - הסר בגדים מזוהמים, שטוף היטב במים זורמים ובסבון, ופנה לקבלת טיפול רפואי • במקרה של מגע בעיניים - שטוף במים זורמים לפחות 15 דקות ופנה מיד לקבלת טיפול רפואי!

מידע לרופא: במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, ביה"ח רמב"ם, חיפה.
טל': 04-7771900.

מס' סדרת ייצור:
מוטבע על גבי האריזה.

7 290107 773454

פיסקת אחריות: המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן. היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.

אופן היישום:

הגידול	המזיק	המינון	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)	הערות
מלון, אבטיח	כנימת עלה הדלועיים	40 סמ"ק לדונם	30	בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה. לא יותר משני טיפולים בעונה. אבטיח: בשטח גלוי בלבד. מלפפון וקישוא: בשטח גלוי וחסוי.
	כנימת עש הטבק	100 סמ"ק לדונם		
קישוא, מלפפון	כנימת עש הטבק	100 סמ"ק לדונם	14	
פלפל, עגבנייה	כנימת עש הטבק	100 סמ"ק לדונם	3	בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה. לא יותר משני היישומים בעונה.
	כנימת עלה האפרסק	40 סמ"ק לדונם		
תפוח אדמה	כנימות עלה	30 סמ"ק לדונם	30	יישום בריסוס והשקייה לאחר מכן.
אפרסמון	קמחית ההדרים	10 סמ"ק/עץ	150	טיפול אביבי בלבד.
*תפוח, אגס	ציקדית ירוקה	2-10 סמ"ק/עץ	30	בהגמעה. המינון תלוי בגודל העץ.
*תפוח	כנימות עלה התפוח	2-10 סמ"ק/עץ	30	בהגמעה בשליש השני של השקייה רגילה.
	כנימת דם	10 סמ"ק לעץ		
*אפרסק, נקטרינה, שזיף, שקד, משמש	ציקדית ירוקה	2-10 סמ"ק/עץ	30	בהגמעה. המינון תלוי בגודל העץ. יישום אחד בעונה עם תחילת הליבלוב ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקייה.
הדרים	עש מנהרות ההדר	**לעצים צעירים:** המינון תלוי בגודל העץ. 1-3 סמ"ק לעץ **לעצים בוגרים:** המינון תלוי בגודל העץ. 5-10 סמ"ק/עץ	30	יישום אחד בעונה עם תחילת הליבלוב ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקייה.
	קמחית ההדרים	10 סמ"ק/עץ		
רימון עצים לא מניבים (עד גיל 3)	כנימת עלה הדלועיים	1-4 סמ"ק/עץ	-	בהתאם לגיל העץ ולנוף העץ.
גפן	כנימה קימחית	1-2 סמ"ק/עץ	3	
	ציקדות	0.5 סמ"ק/עץ		
בננה	כנימת הפנטולוגיה	100 סמ"ק/דונם	7	יש להזריק את התכשיר מהול במים, בשליש השני של ההשקיה במערכות מים מנותקות אוויר.
*מנגו	מגינית אדומה	10 סמ"ק/עץ	-	יישום אחד בסתיו, לאחר קטיף.
*זית	מגינית אדומה	10 סמ"ק/עץ	30	בהגמעה בשליש השני של השקייה רגילה בסתיו ו/או באביב.
*פקאן	כנימת עלה הפקאן	15 סמ"ק לעץ מבוגר	40	בהגמעה ליד הטפטפות או ליד המתזים ואחר כך יש לבצע השקיית החדרה.
*תמר	ציקדת הדבש	5 סמ"ק/עץ	14	בהגמעה בשליש השני של השקייה רגילה בסתיו ו/או באביב.
**פרחים: חרצית, גרברה, ורוניקה, ורד, גיבסנית, אסטר, פלוקס, לימוניום, סולידגו, ליזיאנטוס, אגרטום, היביסקוס	כנימת עש הטבק	100 סמ"ק/דונם	-	הגמעה תבוצע במהלך השליש השני של ההשקייה. אין להשתמש בתכשיר יותר מפעמיים בעונה ובמירווח שהינו קטן מחודש. מיועד לגידולים בקרקע בלבד.
	כנימות עלה	40 סמ"ק/דונם		

* פעילות התכשיר בעצי-פרי מתחילה 10-14 יום אחרי היישום בהגמעה. חלקה המיועדת לטיפול בהגמעה צריכה להיות נקייה מעשבים.
** אם טרם התנסית בתכשיר בזנים השונים, יש לנסות תחילה על מספר מצומצם של צמחים.