



OPEN HERE

דרגת רעילות: מסוכן (IV)

מס' או"ם: 3077

רישיון השירותים להגנת הצומח מס':

94/ה"צ/1288

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
وليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

מיוצר ע"י: קורטבה, צרפת

®=Registered trademark of

Corteva Agriscience International S.a.r.l.

משווק ע"י: גדות אגרו בע"מ

GADOT
Agro

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500

טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

טיטוס 25 גר
Titus® 25 WG
تیتوس

קוטל עשבים

גרגרים רחיפים WG

קוטל עשבים ברני
בעגבנייה, בתירס מספוא
ובתפוח אדמה

מכיל: Rimsulfuron Methyl 25%

קבוצה 2 מעכב פעילות האנזים ALS

תכולה: 100 גרם

תנאי מכירה: המוכר אחראי לכך, שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המופיע על גבי תווית האריזה, ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות ובתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה ע"י המוכר. במקרים מעין אלה חלה האחריות במלואה על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.



עידכון תווית: 08/2022 | 509100920001000

K45261/2111 - ISRAEL

Xxxxx: (Lot N°:)

מס' סדרת ייצור:

50X20MM MINIMUM
NO TEXT NO COLOR ON THIS ZONE
(THIS SQUARE MUST BE DELETED BEFORE PRINTING)



טיטוס 25 גר
Titus® 25 WG
טیتוס

קוטל עשבים

גרגרים רכיפים WG

קוטל עשבים ברני
בעגבנייה, בתירס מספוא
ובתפוח אדמה

מכיל: Rimsulfuron Methyl 25%

קבוצה 2 מעכב פעילות האנזים ALS

תנאי מכירה: המוכר אחראי לכך, שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המופיע על גבי תווית האריזה, ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות ובתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה ע"י המוכר. במקרים מעין אלה חלה האחריות במלואה על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.

דרגת רעילות: מסוכן (IV)
מס' או"ם: 3077
רישיון השירותים להגנת הצומח מס':
1288/ה"צ/94

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
وليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

מיוצר ע"י: קורטבה, צרפת

®=Registered trademark of
Corteva Agriscience International S.a.r.l.

משוקק ע"י: גדות אגרו בע"מ

GADOT
Agro

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

עידכון תווית: 08/2022 | 509100920001000

תכולה: 100 גרם K45261/2111 - ISRAEL

מיני עשבים רגישים לטיטוס:

דגניים: דורת ארם צובא (קוצאב), דורה רותמית, אצבען מאדים, קנכרוס, מיני זיפן, זנב שועל, זון, שבולת שועל.

רחבי עלים: ירבוז מופשל, ירבוז פלמרי, קוטב מצוי, ירוקת החמור, כף אווז, אבוטילון, קדד, חלמית, בר גביע, לכיד הנחלים, מיני סוככיים ומיני מצליבים.

המינים: ירבוז שרוע, דוחנית השלחין, דוחנית התרנגולים, חלבולב קעור, רגלת הגינה וחבלבל השדה נפגעים ע"י טיטוס במינונים הגבוהים והתפתחותם מעוכבת.

גמאים: טיטוס מעכב את צמיחתו של גומא הפקעים. השפעתו קצרה ונמשכת כ-3 שבועות בקיץ וכ-5 שבועות בסתיו או באביב המוקדם. להשגת עיכוב ממושך נדרשים 2 יישומים עוקבים, כמפורט בהוראות השימוש.

כללי: טיטוס שייך לקבוצת הסולפוניל אוראה ומיועד להדברת עשבים בעגבנייה בשטח הפתוח, בתירס מספוא ובתפוח אדמה, במתן לאחר ההצצה או לאחר השתילה, במפורט בטבלת הוראות השימוש. התכשיר נקלט בעיקר בעלוות העשבים ומוסע בצמח אל קודקודי הצמיחה בעלוות ובשורש. במינים רגישים, הצמיחה נעצרת בתוך שעות ספורות לאחר היישום. קטילה מלאה מושגת כעבור 10-20 יום ממועד היישום. ככל שנבטי העשבים צעירים יותר, יעילות ההדברה טובה יותר. להדברת עשבים מפותחים נדרש מינון גבוה יותר וכיסוי מלא של העלוות בתרסיס. תוספת משטח לא יוני משפרת את תוצאות ההדברה. גשם היורד בטרם חלפו 4 שעות מהריסוס עלול לפגום ביעילות ההדברה. לתכשיר יש פעילות שאריתית קצרה בקרקע למשך ימים ספורים, כאשר הוא מופעל בגשם או בהמטרה.

רעילות לדבורים: התכשיר אינו רעיל לדבורים.

הוראות שימוש:

הכנת התרסיס: את הכמות השקולה של התכשיר מערבבים במים בכלי נפרד ושופכים למכל המרסס המלא עד מחציתו במים. תוך כדי בחישה מוסיפים את יתרת המים ומוזגים משטח טיבולין בריכוז 0.05%.

אופן היישום: השתמש אך ורק בכלי היישום המקובלים לריסוס קוטלי עשבים ובנפחי תרסיס המתאימים לכיסוי נאות של עלוות עשבי הבר בתחום נפחים של 10-40 ליטר לדונם. **אל תרסס טיטוס מהאוויר.**

אמצעי זהירות בעת הריסוס:

1. אל תרסס את התכשיר בשדה הנמצא בתנאי עקה מחשש לפגיעה בגידול התרבות ולפגיעה ביעילות ההדברה.
2. אל תרסס בשעת רוח, כדי למנוע רחף של התרסיס לשדות ולגידולי תרבות שכנים.

אזהרות: מזיק בבליעה. עלול לגרום גירוי בעיניים ובעור.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת הטיפול בתכשיר, לבש בגדי עבודה ארוכים ועליהם סרבל עמיד לכימיקלים עם שרוולים ומכנסיים ארוכים, כובע, כפפות עשויות חומר עמיד לכימיקלים (ניטריל) לפי תקן EN-374/3, מגפי גומי, משקפי מגן (תקן EN-166), מסיכת חצי פנים להגנה על דרכי הנשימה (תקן EN-140) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3. מנע מגע של התכשיר או של התרסיס עם העור, עם העיניים או עם הבגדים. אל תשאף את התרסיס או את אבק התכשיר. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

אזהרות לסביבה:

רעילות לחי במים: רעיל מאוד לדגים וליצורים החיים במים עם השפעות ממושכות. מנע זרימה ורחף לבריכות הדגים ולמקורות מים.

טבלת אופן היישום:

הערות	המינון או הריכוז והוראות ליישומים חוזרים	העשבים והשלב הפנולוגי בעת היישום	הגידול והשלב הפנולוגי בעת היישום
<ul style="list-style-type: none"> - הוסף משטח טיבולין בריכוז 0.05%* - רסס בנפח תרסיס המתאים לכיסוי מלא של עלוות עשבי הבר. - תיתכן הצהבה חולפת בקוודקודי הצמיחה של צמחי העגבנייה, שתחלוף תוך ימים ספורים לאחר הריסוס. 	<p>10-5 ג'ד' במקרה של הצצה מחודשת של עשבים, או במקרה של התחדשות הצמיחה, מומלץ לרסס פעם נוספת כעבור כשבועיים.</p>	<p>עשבים חד-שנתיים: עד שלב של 4 עלים אמיתיים. עשבים רגישים: בגובה עד 20 ס"מ. דורת ארם צובא: מ-3 עלים ועד הסתעפות בגובה 10-40 ס"מ.</p>	<p>עגבנייה: בשטח הגלוי. עגבנייה שתולה: לאחר קליטת השתילים ובהמשך עונת הגידול. עגבנייה זרועה: לאחר ההצצה, החל משלב של 2 עלים אמיתיים.</p>
	<p>10 ג'ד' יש לרסס פעם נוספת כעבור כשבועיים במינון 10-5 ג'ד' בהתאם לרמת השיבוש.</p>	<p>גומא הפקעים: לאחר ההצצה ולפני הפריחה.</p>	
	<p>0.025%** בנפח תרסיס של 25-50 ל'ד'.</p>	<p>בריסוס מוקדים על נוף העשבים והגידול התרבותי.</p>	

הערות	המינון והוראות ליישומים חוזרים	העשבים והשלב הפנולוגי בעת היישום	הגידול והשלב הפנולוגי בעת היישום
<ul style="list-style-type: none"> - הוסף משטח טיבולין בריכוז 0.05%* - רסס בנפח תרסיס המתאים לכיסוי מלא של עלוות עשבי הבר. - אל תרסס טיטוס בשדה תירס במשך 7 ימים לאחר ריסוס בתכשיר זרחן אורגני ואל תרסס תכשיר זרחן אורגני בטרם חלפו 4 ימים מהטיפול בטיטוס. 	<p>5 ג'ד' במקרה של הצצה מחודשת של עשבים, או התחדשות הצמיחה, מומלץ לרסס פעם נוספת כעבור כשבועיים, בתנאי שצמחי התירס לא פיתחו יותר מ-6 עלים.</p>	<p>עשבים חד-שנתיים: עד שלב של 4 עלים אמיתיים. דורת ארם צובא: מ-3 עלים ועד הסתעפות.</p>	<p>תירס למספוא בשלב של 2-6 עלים אמיתיים מהזנים: עזוז, 643, 646, JX-180, 3358, 9220, 315, 399, 897, חלמיש, 8460</p>
	<p>שילוב של טיטוס 5 ג'ד' + אטרנקס 75 ג'ד' במכל המרסס.</p>	<p>להרחבת תחום הקטילה ובנוכחות של דטורה, לכיד, ארכובית, חבלוב וענבי שועל.</p>	

הערות	המינון או הריכוז והוראות ליישומים חוזרים	העשבים והשלב הפנולוגי בעת היישום	הגידול והשלב הפנולוגי בעת היישום
	0.025% ** בנפח תרסיס של 30 ליטר לדונם מרוסס.	בריסוס מכוון אל בסיס הצמחים.	צמחי תירס מפותחים
<ul style="list-style-type: none"> - הוסף משטח טיבולין בריכוז 0.05%*. - רסס בנפח תרסיס המתאים לכיסוי מלא של עלוות עשבי הבר. - תיתכן הצהבה קלה בקודקודי הצמיחה של צמחי תפוח אדמה. 	7.5-5 ג'ד'	עשבים חד-שנתיים: נבטים: עד שלב של 4 עלים אמיתיים.	תפוח אדמה מהזנים: מונדיאל, טימטה, ניקולה, אטלס, רימרקה, דזירה, דרגה, קרה, דאימונד, אלפא, אוונדל, קלוסטר, רוזוול, דיטה, הרמס, אטלנטיק. לאחר גמר ההצצה ולפני סגירת הנוף.
	7.5 ג'ד'	גומא הפקעים: לעיכוב התפתחות לאחר גמר ההצצה ולפני הפריחה.	

* 0.05% = 5 סמ"ק ל- 10 ליטר תרסיס ** 0.025% = 2.5 גרם ל- 10 ליטר תרסיס

העמידות כמפורט ובדפי ההדרכה (כגון: שילוב עם קוטלי עשבים בעלי מנגנון פעולה שונה).

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו, מומלץ באול קליר אקסטרם בריכוז 0.5%, לפי ההוראות המפורטות בתווית התכשיר אול קליר אקסטרם. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות המאושרות ע"י המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

שילובים במכל המרסס:

1. מומלץ לשלב משטח טיבולין בריכוז 0.05% מנפח התרסיס בתירס מספוא, בעגבנייה ובתפוח אדמה.
2. ניתן לשלב אטרנקס בטיטוס על פי הוראות השימוש בתירס מספוא.
3. אין לשלב טיטוס בתכשירים נוספים.

גידולים הבאים במחזור: טיטוס אינו מהווה סיכון לגידולים עוקבים במחזור, בתנאי שהשטח נחרש או תוחח ופרק הזמן בין מועד היישום לבין תחילת הגידול העוקב הוא ארוך מ-3 חודשים.

עמידות: באזור הנגב התגלו אוכלוסיות של עשבי בר שפיתחו עמידות או סבילות לתכשירים מעכבי ALS. בשדות משובשים באוכלוסיות אלה, יש להקפיד ולנקוט באמצעים המכוונים להתמודד עם בעיית

3 פעמים, במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מכל המרסס. נקב ומעך את האריזות השטופות והשלך אותן למכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה: כללי, אין לתת כל דבר דרך הפה לאדם מחוסר הכרה • במקרה של **שאיפה**, העבר את הנפגע למקום מאוורר, פנה לרופא במידת הצורך • במקרה של מגע **בעור**, הסר מיד בגדים מזוהמים, שטוף מיד את האיבר שנחשף לתכשיר במים ובסבון, אם התפתח גירוי פנה לרופא • במקרה של מגע **בעיניים**, הסר עדשות מגע אם ישנן, שטוף את העיניים במים זורמים נקיים במשך 15 דקות, אם הגירוי נמשך פנה לרופא • במקרה של **בליעה**, פנה לרופא. אין לגרום להקאה ללא הנחייה מגורם רפואי מוסמך, אם הנפגע בהכרה שטוף את פיו במים.

מידע לרופא: במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.


הגנה אישית בגמר העבודה: בתום העבודה התרחץ היטב והחלף בגדיך. בגדים מזוהמים כבס בנפרד משאר הכבסים. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.

מועד כניסה מחדש (Re-Entry): כניסה לשטח המטופל מותרת אך ורק לאחר התייבשות מלאה של התרסיס על עלוות הצמחים.

אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, מאוורר, קריר ומוצל המיועד לאחסון תכשירי הדברה, הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים.

טיפול בתכשיר שהתפזר: תכשיר שהתפזר יש לאסוף לכלי אטים (רצוי להשתמש בשואב אבק תעשייתי) ולפנות לאתר פסולת רעילה. לתכשיר שהתפזר, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזות היטב, לפחות



50X20MM MINIMUM
NO TEXT NO COLOR ON THIS ZONE
(THIS SQUARE MUST BE DELETED BEFORE PRINTING)

NO PRINT – GLUE PAGE