

קרא בעיון את התוית לפני השימוש

# אלאר

# آلار

# ALAR®

### גרגרים מסיסים

### מווסת צמיחה

מכיל: Daminozide 85%

### מיועד לטיפול בפרחים:

1. לקיצור מפרקים ולריסון הצימוח.
2. לשיפור צבע העלווה.
3. להקדמת הופעת פקעי פריחה.

**דרגת רעילות: מסוכן (IV)**  
**מס' או"ם: לא נקבע**

**לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד**  
**ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط**

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 08/1978/צ

מיוצר ע"י Bold Formulators, ארה"ב  
עבור MacDermid Agricultural Solutions, ארה"ב

## מרחב אגרו

## MERHAV AGRO

**המשרד:** מתחם גדות אגרו  
ת"ד 555, קדרון 7079500  
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

מס' סדרת ייצור:

**תכולה: 1 ק"ג**

**תנאי מכירה:** המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן. היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.

08/20 alar\_gargirim\_1kg, size: 40x13 cm

**כללי:** התכשיר אלאר הינו מווסת צמיחה הפועל במערכת ההורמונלית בצמח. יעילות התכשיר מושפעת מגורמי סביבה שונים, כגון: טמפרטורה, לחות, תאורה, דישון וזמינות מים. כמו כן מותנית יעילותו של התכשיר במין הצמח, בזן, בקצב הצמיחה ובשלב הפנולוגי. לכן חלה חובה על המשתמש לערוך ניסוי מקדים בתנאי הגידול הייחודיים במשקו, כדי לקבוע את העיתוי והמינון המדוייק בתחום הריכוזים המצויינים בטבלה.

**מיועד לשימוש בגידולים לא אכילים. אסור ליישום על גידולים המיועדים למאכל אדם או למאכל בעלי חיים.**

**■ אזהרות:** התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים. גורם לגידולים בחיות מעבדה.  
**■ אמצעי זהירות ומיגון:** בעת הטיפול בתכשיר לבש בגדים ארוכים, משקפי מגן לעיניים, מסכת אבק להגנה על דרכי הנשימה וכפפות PVC. אל תשאף את התכשיר המרוכז או את רחף התרסיס. הימנע ממגע התכשיר והתרסיס בעור, בעיניים ובבגדים. אין לאכול, לשתות ולעשן בעת הכנת התרסיס ובעת הריסוס.  
**■ רעילות לדגים ולדבורים:** רעילות נמוכה לדגים ולדבורים.

**הוראות שימוש:**

**■ הכנת התרסיס:** לאחר מילוי המרסס, מוסיפים את הכמות השקולה בהתאם לנפח המיכל ובוחשים במשך 3-5 דקות. **אופן היישום:**

ה ג י ד ו ל	מועד היישום	הריכוז (%)	נפח התרסיס (ל'/ד')	ה ע ר ו ת
<b>הרצית לגידול פרחים קטנים</b>	<b>ריסוס I:</b> תוך 7 ימים מתחילת משטר היום הקצר (ראה הערה) <b>ריסוס II:</b> במידת הצורך, כ-3 שבועות מאוחר יותר. <b>ריסוס III:</b> בעונת הקיץ, בזנים בעלי עוקצי פרחים ארוכים, כאשר מופיעים פקעי פריחה.	0.3	30-50 ליטר/ד' לכיסוי מלא מהמקובל	בחלקות המיועדות לטיפול באלאר יש להתחיל את משטר היום הקצר מאוחר יותר, כאשר הגבעול ארוך ב-5 ס"מ
<b>הרצית ייצור יחורים במט-אם</b>	ריסוס כל 7 ימים	0.05-0.1 (הריכוז הגבוה בזנים בעלי צימוח נמרץ)	של קודקודי הצמחים	
<b>גידול עציצים פורחים</b>	<b>ריסוס I:</b> 10 ימים לאחר הקיטום, או כאשר הפריצות באורך 2.5-4 ס"מ <b>ריסוס II:</b> במידת הצורך, כ-3 שבועות מאוחר יותר	0.2-0.3	בזנים בעלי צימוח נמרץ אפשר לרסס ריסוס נוסף במידת הצורך	
<b>גלוקסיוניה</b>	לאחר העברה לעציץ הסופי ולפני תחילת התארכות הגבעולים	0.1		
<b>גדרניה</b>	לאחר קיטום היחורים. ריסוסים נוספים - במידת הצורך, אך לא יותר מ-2 טיפולים	0.35-0.7	ריסוס להרטבה מלאה של נוף הצמחים	כתוצאה מהריסוס באלאר תלדים מקבלים גוון כהה יותר ומתקבלת הקדמה בהופעת פקעי הפריחה
<b>הדרגניה</b>	<b>טיפול קייצי:</b> 4 שבועות לאחר קיטום <b>טיפול חורפי:</b> עם תחילת התפתחות ענפי הפריחה	0.6-0.8	בקיץ יש לרסס פעמיים נוספות - במידת הצורך	
<b>היפואסטס</b>	14-7 ימים לאחר העתקה לעציץ הסופי	0.35-0.45	הצמחים	
<b>נצינת</b>	לאחר הקיטום - בתדירות של אחת לשבועיים	0.6		
<b>פיטוניה (גידי הכסף)</b>	14-7 ימים לאחר העתקה לעציץ הסופי	0.25-0.35		
<b>צינרריה</b>	לאחר היוצרות פקעים או לפני התארכות גבעול הפריחה	0.3		
<b>גידול שתילי גוש</b>	3-2 שבועות לאחר העתקה לעציץ הסופי	0.3-0.5		הטיפול באלאר מעכב את הפריחה בכ-7 ימים

**בגמר השימוש:**

**■ ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**■ סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**■ הגנה אישית בגמר העבודה:** בתום העבודה, רחץ היטב את ידיך במים ובסבון, התקלח והחלף את בגדיך. בגדים מזהמים יש לכבס בנפרד.

**■ מועד כניסה מחדש (Re-entry):** כניסה לשטח המטופל מותרת בחלוף 24 שעות מהריסוס.

**■ אחסון:** אחסן את התכשיר במקום נעול ויבש, המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממגע ידם של אנשים לא מוסמכים. הרחק מצרכי מזון והאבסה. הרחק מאש וממקורות חום.

**■ במקרה של התפזרות התכשיר:** תכשיר שהתפזר יש לאסוף לכלי סגור (רצוי להשתמש בשואב אבק תעשייתי). לתכשיר שהתפזר, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת לפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**■ טיפול באריזות ריקות:** שטוף את האריזות היטב, לפחות 3 פעמים, או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזות השטופות והשלך אותן למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

**■ עזרה ראשונה:**

- במקרה של מגע בעור - יש לשטוף במים ובסבון.
- במקרה שהתכשיר חדר לעיניים - יש לשטוף במים נקיים זורמים במשך 15 דקות.
- במקרה של בליעה - אין לגרום להקאה. שטוף את הפה במים ופנה לרופא.

**■ מידע לרופא:** במרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה, טל': 04-7771900.

