

# פאזור FAZOR SG فازور

גרגרים מסיסים

מכיל: Maleic Hydrazide Potassium Salt 60%

מווסת צמיחה לעיכוב הבלבוב של פקעות תפוח אדמה ושל בצל באחסון

דרגת רעילות: מסוכן IV

מס' או"ם: 3077

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 10/ה"צ/4057

אין לרסס על צמחי תפוח אדמה המיועדים לזרעים. ואין לקחת זרעים משדה שטופל בפאזור.

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד  
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

תכולה: 5 ק"ג

מרחב אגרו  
MERHAV AGRO

המשרד: מתחם גדות אגרו  
ת"ד 555, קדרון 7079500  
טל': 08-6308000, פקס': 08-6308001

מס' סדרת ייצור:



מיוצר ע"י Exwold Technology, אנגליה  
עבור Arysta LifeScience, הולנד

עודכן תווית: 08/20 517010720050000

# פאזור פאזור FAZOR SG

גרגרים מסיים

מכיל: Maleic Hydrazide Potassium Salt 60%

## מווסת צמיחה לעיכוב הבלבול של פקעות תפוח אדמה ושל בצל באחסון

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

דרגת רעילות: מסוכן IV

מס' או"ם: 3077

רשיון הישירותים להגנת הצומח מס': 10/ה"צ/4057

מיוצר ע"י Exwold Technology, אנגליה

עבור Arysta LifeScience, הולנד

אין לרסס על צמחי תפוח אדמה המיועדים לזרעים, ואין לקחת זרעים משרדה שסופג בפאזור.

**מרחב אגרו**  
MERHAV AGRO  
המשרד: מתחם גדות אגרו  
ת"ד 555, קדרון 7079500  
טל: 08-6308000, פקס: 08-6308001

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד  
ليس للاستخدام المنزلي - للاستخدام الزراعي فقط

### תכולה: 5 ק"ג

\* אין לרסס על צמחי תפוח אדמה המיועדים לזרעים.  
\*\* לפני הטיפול יש לדגום מהשרדה צמחים מייצגים ולבדוק את גודל הפקעות. השתמש במידוי מתאים.

**שילובים:** אסור לשלב בפאזור תכשיר נוסף כל שהוא.

#### בגמר השימוש:

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשתוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשתוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל אוסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית בגמר העבודה:** מיד בגמר הריסוס יש להתקלח במים ובסבון ולהחליף את כל הבגדים. בגדי ריסוס מזהמים יש לכבס בנפרד משאר הכבסים. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו.

**כניסה מחדש לשטח המטופל:** אין להיכנס לשטח המרוסס ללא הגנה מתאימה, בטרם התייבש טיפוח התרסיס על נוף הצמחים.

**אחסון:** שמור את התכשיר סגור באריזות המקורית, במקום קריר, יבש, מוצל, מאוורר, מוגן ונעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים אל מוסמכים. הקפד לבל יבוא התכשיר במגע עם חומרי מזון או מספוא. זרעים, דשנים וכיו"ב. לאחר כל שימוש סגור היטב את האריזה המקורית.

**במקרה של התפזרות התכשיר:** אוסוף תכשיר שהתפזר (רצוי) באמצעות שואב אבק תעשייתי לכלי סגור. יש להימנע ככל האפשר מייצק ענן אבק. לתכשיר שהתפזר, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון יש להתייחס כפסולת מסוכנת החייבת בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**טיפול באריזות ריקות:** השלך את אריזת התכשיר שהתרוקנה לפח האשפה.

**עזרה ראשונה:** במקרה של מגע **בעור:** יש להסיר בגדים מלוכלכים ולרוחץ את איברי הגוף שהוזדמו במים ובסבון. אם הופיע גירוי פנה לרופא. במקרה של מגע **בעיניים:** יש לשתוף את העיניים במים נקיים למשך 15 דקות לפחות ולקרוא לרופא אם מופיע גירוי. במקרה של **בליעה:** אין לגרום להקאה. שטוף את הפה במים. פנה לרופא. במקרה של **שאיפת** התכשיר: העבר את הנפגע לאוויר צח. קרא לרופא. **מידע לרופא:** במרכז ארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-7771900.

**כללי:** פאזור הינו תכשיר סיסטמי הנקלט בעלוות הצמח ומוסע מטה אל הפקעות והבצלים. החומר הפעיל מעכב חלוקת תאים ואינו מונע את גדילתם. חשוב להקיף ולרסס את התכשיר על צמחים בריאים, במועד המתאים, בהתאם להנחיות ולאמצעי הזהירות המפורטים בה.

**אמצעי זהירות ומיגון:** בעת הטיפול בתכשיר לבש כפפות עשויות חומר עמיד לכימיקלים (ניטריל), מגפי גומי, משקפי מגן, מסכה לדרכי הנשימה עם מסנן P<sub>2</sub> וסרבל עמיד לכימיקלים עם שריונים ומכנסיים ארוכים. נמנע מגע של התכשיר או התרסיס עם העור, העיניים והבגדים. אל תשאף את התרסיס או את אבק התכשיר. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

**רעילות לדגים:** התכשיר רעיל ליצורים החיים במים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית.

#### הוראות שימוש:

**תפוח אדמה:** פאזור המרוסס בשדה על צמחי תפוח אדמה במועד המומלץ יעכב התעוררות ולבלוב של פקעות באחסון. היישום ינתן בריסוס על נוף צמחי תפוח אדמה כ-3-3 שבועות לפני הקמלת הנוף, כאשר הפקעות המיועדות לאסיף הן באורך גדול מ-25 מ"מ (חלוקת התאים הושלמה). הטיפול מיועד לפני תפוח אדמה עם רמת תדרמה נמוכה המיועדים לתעשייה או לייצוא וכן לזנים המיועדים לאחסון ממושך. אין לרסס על צמחי תפוח אדמה הנמצאים במצב עקה כל שהוא. אין לרסס על צמחים שנפגעו ממחלות נוף או ממחלות חסר. יש לשמור על מרווח של 24 שעות ללא גשם או המטרה לאחר הריסוס כדי להבטיח קליטה מלאה של התכשיר בעלוה.

#### אין לרסס על תפוחי אדמה המיועדים לזרעים.

**חשוב:** אוסף הפקעות בשדה יתבצע רק לאחר שנצרה קליפה יציבה המתאימה לאחסון ממושך ולכן יש להמתין כשלושה שבועות ממועד ההקמלה ועד לאיסוף הפקעות. **בצל:** פאזור מיועד לריסוס על נוף בצל לעיכוב לבלוב באחסון. הריסוס ייעשה לאחר שהבצל הגיע להבשלה מלאה ולתחילת צניחה - כאשר העלוה עדיין ירוקה (רצוי במצב של 25% ובכל מקרה לא יותר מ-50% צניחה). אין לרסס בצל לפני שלב הצניחה. ריסוס מוקדם משבועיים לפני הבשלה עלול לגרום לבצל ספוגי. אין לרסס בצל שמרבית עלותו התייבשה כתוצאה ממחלות, ממיזקים או מסיבה אחרת כלשהיא, כיוון שלא תהיה קליטה והעברה של החומר לבצל. קליטת החומר תהיה יעילה כל עוד יש לבצל לפחות 5 עלים ירוקים. טיפול בפאזור יעכב את לבלוב הבצל באחסון, אך מעבר לכך אין לו השפעה על כושר השתמרות הבצל. אין להשקות בהמטרה לפחות 24 שעות לאחר הריסוס. המטרה מוקדמת תקטין את יעילות החומר. אין לרסס בצל המיועד לריבוי.

**הכנת התרסיס:** מלא את מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה והפעל את הערבול. הוסף בהדרגה את כמות פאזור הדרושה והשלם את יתרת המים תוך ערבול מתמיד.

**אופן היישום:** הריסוס יבוצע בשעות הערב או בשעות הבוקר המוקדמות וזאת כדי להבטיח שעות לחות מספיקות לקליטת התכשיר בעלוה. אין לרסס כאשר הטמפ' גבוהות מ-25 מ"צ או כאשר צפויים תנאי שרב.

| הגידול  | הייעוד                               | מינון (ג/ד') | נפח התרסיס (ל/ד')                          | מועד הריסוס*  | ימי המתנה מריסוס לשיווק |
|---|--------------------------------------|--------------|--|---|-------------------------|
| תפוח אדמה למאכל*<br>מוזנים: אנאבל, ניקולה, קינג אדוארד, דוירה, יאל, מונדיאל, ווינסטון, רודאל, הרמס, קול'ברי, שפודי, נייטה, רוזאנה | עיכוב הבלבול והבניטה של פקעות באחסון | 500          | בריסוס קרקע 50-30 להבטחת כיסוי מלא של הנוף | הריסוס יבוצע כ-5-3 שבועות לפני הקמלת הנוף ובתנאי ש-90% מהפקעות השלימו את חלוקת התאים והם באורך של 25 מ"מ*<br>לפחות. | 28 ימים לפחות           |
| בצל למאכל   | עיכוב הבלבול של בצל באחסון           | 360          | 50-40                                      | לאחר שהבצל הגיע להבשלה מלאה ולתחילת צניחה (25%-50% צניחה) כאשר העלוה עדיין ירוקה                                    | -                       |

**תנאי מכירה:** המוכר אחראי לכס שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות ובתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנגזרת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים שאינם המוכר יכול לצפות מראש. במקרים מעין אלה חלה האחריות במלואה על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.