



תרכיז נוזלי SL – מווסת צמיחה

מכיל: 40 גרם בליטר Gibberellic Acid

(כל 25 סמ"ק ג'יברלון מכילים 1 גרם חומר פעיל)

דרגת רעילות:

מסוכן לבריאות (III)

מספר או"ם: 1993

רישיון השירותים להגנת

הצומח מס': 1099/ה"צ/90



קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד

ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط



מס' סדרת ייצור:

תכולה: 1 ליטר

מיוצר ע"י חברת Schirm GmbH, גרמניה

עבור Fine Agrochemicals, אנגליה fine



פסקת אחריות: המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן. היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.

אופן היישום:

הגידול	המטרה	מועד היישום	ריכוז ח"פ חלקי מיליון	כמות תכשיר ל-100 ליטר מים	משטחים ושילובים	נפח התרסיס (l)
גפן זנים: פרלט, סולטנינה	פרלט דילול האשכול והגדלת הגרגר	1. ב-90%-100% פריחה 2. בגמר חנטה 3. 7 ימים לאחר מכן	20-15 40-30 40-30	50-37.5 סמ"ק 100-75 סמ"ק 100-75 סמ"ק	טריוון X-100 0.025%	הרטבה מלאה
		1. ב-50% פריחה 2. ב-70%-80% פריחה 3. בפריחה מלאה 4. לאחר גמר חנטה ולאחר מכן 2-3 ימים נוספים במירווח של 6-4 ימים	20-15 20-15 30 40-30	50-37.5 סמ"ק 50-37.5 סמ"ק 75 סמ"ק 100-75 סמ"ק		
הדרים: ולנסיה	הפחתת קמטת	ריסוס בסוף יולי - אמצע אוגוסט (ישנם יחיד)	20	50 סמ"ק	טריוון B-1956 0.025% + חומצה זרחיתית 0.1% ⁽²⁾	הכנת התרסיס: מלא את מכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה והפעל את הערבול. הוסף בהדרגה את כמות התכשיר הדרושה ולאחריו את התוספים והשלם את יתרת המים תוך ערבול מתמיד. הוספת תוסף רק באותם מקרים שהדבר צויין בפירושי הריסוס חייב להיעשות בסמוך להכנת התרסיס. אין להשהות את התרסיס ליום המחרת. כאשר לשימוש במערך האריזה במשולב בדוג ראה בתווית הדוג.
	הגברת חנטה	ריסוס במלוא פריחה. רצוי לרסס שנית כעבור 10 ימים	25	62.5 סמ"ק	טריוון B-1956 0.025% + או BB-5 0.05%	
פומלית	שמירת הצבע הירוק	ריסוס באוגוסט-ספטמבר. ניתן לרסס שנית כחודש לאחר מכן	10-5 או 5	25-12.5 סמ"ק	טריוון B-1956 0.025% + חומצה זרחיתית 0.1% ⁽²⁾	15-12 ליטר לעץ
			10-5 או 5-2	12.5 סמ"ק	L-77 0.04% או שמון קיצי 1.75%	
מינאולה	הארכת עונת הקטיף והפחתת קמטת	ריסוס לפני שבירת צבע (אוקטובר) (ישנם יחיד)	10	25 סמ"ק	טריוון B-1956 0.025% + חומצה זרחיתית 0.1% ⁽²⁾	15-12 ליטר לעץ
			10-5 או 5-2	25-12.5 סמ"ק	L-77 0.04%	
אשכולית	הארכת עונת הקטיף	ריסוס באוקטובר-דצמבר	10-5	25-12.5 סמ"ק	טריוון B-1956 0.025% + חומצה זרחיתית 0.1% ⁽²⁾ פאסט פרוט 0.018% או BB-5 0.05% + חומצה זרחיתית 0.1% ⁽²⁾ פאסט פרוט 0.018%	15-12 ליטר לעץ
			50	250 סמ"ק ב-200 ליטר דונג		
אפרסמון	הפחתת נשירה	ריסוס יחיד בשלב שיא הפריחה - תחילת חנטה	30	75 סמ"ק	טריוון X-100 0.025%	הרטבה מלאה
			50	125 סמ"ק	טריוון X-100 0.025%	
אבוקדו במשתלה זנים: האס, מלמה	עיסוב התמימות הפריחה	פעם בחודש החל בראשית ספטמבר ועד תחילת פברואר	50	125 סמ"ק	שטח 90 0.05%	הרטבה כללית של השתלה 100-75 סמ"ק/שתיל
			200-100 או 0.25%-0.5%	500-250	טיבולין 0.05%	
אגס (מגיל 4 ומעלה)	הגברת חנטה	ריסוס בתחילת פריחה מלאה	20-10	50-25 סמ"ק	טריוון X-100 0.025%	הרטבה מלאה
			500	125 סמ"ק 10-10 ליטר מים		
פריחים: גיבסית	הארכת גבעול	בניבנסית שתולה: לאחר התבססות השתלה, בניבנסית גומה: לאחר הפועת צמחון חדש.	500	125 סמ"ק	טריוון X-100 0.025%	הרטבת מרכז הצמח
			200-100 או 0.25%-0.5%	500-250	טיבולין 0.05%	

(1) בהתאם לגודל העצים להשגת כטיס מיטבי של הנוף (2) חומצה זרחיתית 85% (0-60-1)

אזהרות: מזיק בבליעה. נוזל ואדים דליקים מאוד. גורם לגירוי חמור בעיניים. עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת.

אמצעי זהירות ומוגן: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן הריסוס לבש בגדי עבודה ארוכים עמידים לכימיקלים, נעלי עבודה גבוהות, כפפות גומי (תקן EN-374/3), משקפי מגן (EN-166), מסכת חצי פנים (EN-140) לדרכי הנשימה עם מסנן (EN-14387) מסוג ABEK-P3. מנע מגע של התכשיר המרוכז או של התרסיס עם העור או עם העיניים. אל תשאף את אדי התכשיר או את התרסיס. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר. **אזהרות לסביבה:** התכשיר אינו רעיל לדגים ולדבורים.

הוראות שימוש:

הכנת התרסיס: מלא את מכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה והפעל את הערבול. הוסף בהדרגה את כמות התכשיר הדרושה ולאחריו את התוספים והשלם את יתרת המים תוך ערבול מתמיד. הוספת תוסף רק באותם מקרים שהדבר צויין בפירושי הריסוס חייב להיעשות בסמוך להכנת התרסיס. אין להשהות את התרסיס ליום המחרת. כאשר לשימוש במערך האריזה במשולב בדוג ראה בתווית הדוג.

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. **ניקוי מערך האריזה:** בגמר היישום יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אח"כ יש לשטוף אותו ואת כל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. **סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, איודו ופינוי לאחר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית במעבדה: בתום הריסוס יש להתקלח במים ובסבון ולהחליף בגדים. בגדי ריסוס מזהמים יש לכבס בפרד משאר הכבסים.

מועד כניסה מחדש: אין להיכנס לשדה המרוסס ללא הגנה מתאימה עד להתייבשות התרסיס. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות, לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

אחסון: שמור את התכשיר באריזה המקורית, במקום מוגן, נעול ויבש המיועד לאחסון תכשירי הדברה, הרחק ממקור חום ומאש. מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. מנע מגע של התכשיר עם חומרי מזון ועם מספוא.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לספוג בחול ולהעביר את החול המזוהם לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריות ריקות: שטוף את הבקבוק היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מכל המרסס. נקב ומעך את הבקבוק השטוף והשלך אותו למכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע בעור, יש לרוחץ מיד במים ובסבון. פנה לרופא אם התפתח גירוי. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים זורמים במשך 15 דקות לפחות, פנה לרופא אם התפתח גירוי. במקרה של בליעה, שטוף את הפה ופנה לרופא. במקרה של שאיפה, יש להעביר את הנפגע לאזור מאוורר. קרא לרופא אם התפתחו סימני הרעלה. **מידע לרופא:** במרכז הארצי לייעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם חיפה. טל': 04-7771900.