

אלאר ALAR®

גרורים מסיסים SG

מוסט צמיחה

מכיל: Daminozide 85%

מיועד לטיפול בפרחים:

- לקיצור מפרקים ולריסון הצימוח.
- לשיפור צבע העלווה.
- להקדמת הופעת פקעי פריחה.

דרגת רעילות: מסוכן (IV) | **מס' או"ם:** לא נקבע
רישיון השירותים להגנת הצומח מס': 08/ה"צ/1978

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

מיוצר ע"י: Bold Formulators, ארה"ב עבור Arysta LifeScience Great Britain, בריטניה

משוקע"י: **גדות אגרו בע"מ**

GADOT
Agro

המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון 7079500
טל': 08-6308000, פקס: 08-6308001

הערה: המוכר אחראי לכך, שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המופיע על גבי תווית האריזה, ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית אך ורק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצויות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה ע"י המוכר. במקרים מעין אלה חלה אחריות על הקנה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.



עידכון תווית: 01/2023 | 501120190010001

אופן היישום:

הגידול	מועד היישום	הריכוז (%)	נפח התרסיס (ל'/'ד')	הערות
חרצית לגידול פרחים קטופיים	ריסוס 1: 10 ימים לאחר הקיטום, או כאשר הפריצות באורך 2.5-4 ס"מ. ריסוס 2: במידת הצורך, כ-3 שבועות מאוחר יותר. ריסוס 3: בעונת הקיץ, בזנים בעלי עוקצי פרחים ארוכים, כאשר מופיעים פקעי פריחה.	0.3	50-30 ל'/'ד' לכיסוי מלא של קודקודי הצמחים	בחלקות המיועדות לטיפול באלאר יש להתחיל את משטר היום הקצר מאוחר יותר, כאשר הגבעול ארוך ב-5 ס"מ מהמקובל.
חרצית ייצור יחורים במטע-אם	ריסוס כל 7 ימים.	0.1-0.05 (הריכוז הגבוה בזנים בעלי צימוח נמרץ)		
גידול עציצים פורחים חרצית	ריסוס 1: 10 ימים לאחר הקיטום, או כאשר הפריצות באורך 2.5-4 ס"מ. ריסוס 2: במידת הצורך, כ-3 שבועות מאוחר יותר.	0.3-0.2		בזנים בעלי צימוח נמרץ אפשר לרסס ריסוס נוסף במידת הצורך.
גלוקסיניה	לאחר העברה לעציץ הסופי ולפני תחילת התארכות הגבעולים.	0.1		
גרדניה	לאחר קיטום היחורים. יישומים נוספים - במידת הצורך, אך לא יותר מ-2.	0.7-0.35	הרטבה מלאה של נוף הצמחים	כתוצאה מהריסוס באלאר העלים מקבלים גוון כהה יותר ומתקבלת הקדמה בהופעת פקעי הפריחה.
הורטנסייה (הידרנג'יה)	טיפול קייצי: 4 שבועות לאחר קיטום. טיפול חורפי: עם תחילת התפתחות ענפי הפריחה.	0.8-0.6		בקייץ יש לרסס פעמיים נוספות - במידת הצורך.
ברוד משובל (היפואסטוס)	14-7 ימים לאחר העתקה לעציץ הסופי.	0.45-0.35		
ניצנית	לאחר הקיטום - בתדירות של אחת לשבועיים.	0.6		הטיפול באלאר מעכב את הפריחה בכ-7 ימים.

הגידול	מועד היישום	הריכוז (%)	נפח התרסיס (ל'/'ד')	הערות
פיטוניה (גידי הכסף)	7-14 ימים לאחר העתקה לעציץ הסופי.	0.35-0.25		
סביון מלבין (צינוריה)	לאחר היווצרות פקעים או לפני התארכות גבעול הפריחה.	0.3		
גידול שתילי גוש פיטוניה, ורבנה, וינקה, טגסט, ציפורני חתול	2-3 שבועות לאחר העתקה לעציץ הסופי.	0.5-0.3	הרטבה מלאה של נוף הצמחים	

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר פסולת הרעילה ברמת חובב. **הגנה אישית בגמר העבודה:** בתום העבודה, רחץ היטב את ידיך במים ובסבון, התקלח והחלף את בגדיך, בגדים מזוהמים יש לכבס בנפרד.

מועד כניסה חדש (Re-entry): כניסה לשטח המטופל מותרת בחלוף 24 שעות מהריסוס.

אחסון: אחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן נעול, מוצל, קריר ויבש, המיועד לאחסון תכשירי הדברה. הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים לא

מוסמכים. הקפד לבל יבוא התכשיר במגע עם דברי מאכל, צרכי האבסה, זרעים, דשנים וכיו"ב. לאחר כל שימוש, סגור היטב את האריזה המקורית. הרחק מאש ומקורות חום.

במקרה של התפזרות התכשיר: תכשיר שהתפזר יש לאסוף לכלי סגור (רצוי להשתמש בשואב אבק תעשייתי). לתכשיר שהתפזר, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון, יש להתייחס כפסולת מסוכנת המחייבת פינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזות היטב, לפחות 3 פעמים, או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מכל המרסס. נקב ומער את האריזות השטופות. היטב אתן ומכל אשפה או לאתר פסולת רעילה. **עזרה ראשונה:** • במקרה של מגע בעור, יש לשטוף במים ובסבון • במקרה שהתכשיר חדר לעיניים, יש לשטוף במים נקיים זרמים למשך 15 דקות • במקרה של בליעה, אין לגרום להקאה. שטוף את הפה במים ופנה לרופא.

מידע לרופא: במרכז הארצי ליעוץ רפואי בהרעלות, ב"ח רמב"ם, חיפה טל': 04-7771900.