




יוניק יוניק Unik

תרכיז רחוי SC - מווסת צמיחה
מכיל: 50 גרם ג'ליטר Uniconazole



דרגת רעילות: מסוכן (IV) | מס' או"ם: לא מסווג | רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': ה'03/1728/צ

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

תכולה: 5 ליטרים

מס' סדרת ייצור, תכולה ופג תוקף
מוטבעים על האריזה.



עירון ותווית: 09/2024

5100614401050007

מיוצר ע"י: דור.קי פיתוח ושווק בע"מ, ישראל
עבור גדות אגרו, ישראל

Dor.Ky החברה
דור.קי פיתוח ושווק



משווק ע"י: גדות אגרו בע"מ
המשרד: מתחם גדות אגרו, ת"ד 555, קדרון, 7079500
טל: 08-6308000, פקס: 08-6308001

GADOT
Agro

הערה: המוכר אחראי לכך, שמוצר זה תואם את המפרט הכימי המפורט על גבי תווית האריזה, ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית או רק כאשר הוא ניתן בהתאם להוראות בתנאי שימוש רגילים. אחריות זו אינה חלה במקרים של שימוש בחוזה בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים, או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה ע"י המוכר. במקרים מעין אלה חלה אחריות על הקונה בלבד. כל אחריות אחרת, ישירה או עקיפה, אינה חלה על המוכר.

מי תהום: התכשיר עלול לזהם מי תהום. אין ליישם חומר הדברה זה באזור שפילת החוף, כאפריט להל: (א) מגבולה הצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים. (ב) מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים. (ג) מחיפה-קריות עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים. לא נכללות באיסור זה חלקות בהן שיעור החרסית הוא 15% ויותר או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% ויותר.

מסיתת חצי פנים (EN-140) לדרכי הנשימה עם מסונן (EN-14387) מסוג ABEK-P3. מנע מגע של התכשיר המרוכז או של התרסיס עם העור או עם העיניים. אל תשאף את אדי התכשיר או את אדי התרסיס. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

סכנות לסביבה:

רעילות ליצורים החיים במים: התכשיר רעיל לחי במים ועלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח. מנע זרימה ורוחף לבריכות דגים ולמקורות מים. **רעילות לדבורים:** יוניק אינו רעיל לדבורים.

כללי: יוניק הינו מווסת צמיחה המעכב את יצירת הורמון הצמיחה ג'יברלין, מבקר את רמת גידול הצמח, רמת הביומסה וגודל הפרי. **זהירות:** התכשיר מייק בבליעה. עלול לגרום גירוי בעיניים, בעור וברקמות ריריות.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת השימוש בתכשיר יש לנקוט באמצעי הזהירות המקובלים בשימוש בתכשירי הדברה. בזמן העבודה עם התכשיר המרוכז ובזמן הריסוס לבש בגדי עבודה ארוכים עמידים לכימיקלים, נעלי עבודה גבוהות, כפפות גומי (תקן EN-374/3), משקפי מגן עם מגני צד (EN-166),

יוניק يونيك Unik

בגמר השימוש:

יקי ציוד המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. הקפד ששאריות המרסס או מי השטיפה לא יזהמו בריכות דגים או מקורות מים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה באיכות המים: מיד בגמר השימוש, יש להתקלח במים ובסבון ולהחזיר את כל הבגדים. בגדי נכסיהם **לחלקה המטופלת:** אין להינסת לחלקה המטופלת ולא הגנה מתאימה לפני חלוף 12 שעות ממועד השימוש או לפני שטיפות המרסס התיישן על עלוות הגידול התרבותי. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות אחר השימוש. הקובלות לפני ניסוח מחדש ללא ציוד מגן אישי. אחסון: שמור את התכשיר סגור בארזתו המקורית, במקום קריר, מוגן ונעול המיועד לאחסון תכשיר הדברה. רחוק מהישג ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים. מנע מגע של התכשיר עם חומרי מזון או עם מסופא.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לנסות בחול או בסונרות, לאספו לכלי אטימ ולעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, שפג ותוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון יחנף לפסולת מסוכנת ויחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול בארזות ריקות: שטוף את המכל היבב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. נקב ומעך את המכל השטוף והשלך אותו לפח האשפה. **עדוה ראשונה:** במקרה של מגע **בעיניים**, יש לשטוף עם מים זורמים במשך 15 דקות לפחות. פנה לרופא אם התפתח גירוי. במקרה של מגע **בעור**, הסר מיד בגדים ונעליים מזוהמים. שטוף בהרבה מים וסבון. קרא לרופא. במקרה של **שאיפה**, העבר את הפנע בעיניך צד והושב את הפנע במנוחה. במידה ומתפתח קושי בנישימה, בצע הנשמה מלאכותית. קרא לרופא מיד. במקרה של **נליעה**, אין לגרום לתקאה. קרא שטוף היבב את הפה בריא. פנה לרופא והצב בפניו את חותית התכשיר.

מידע לרופא: במרכז הארצי ליישון בריא בהרעלות. בי"ח רמב"ם, חיפה, טל': 04-7717900.

ליגדולים שנימים. הכנת התרסיס או ממיסת ההגממה: את הכמות הדרושה של יוניק יש להוסיף למכל המרסס או למכל ההגממה המלא במחצית כמות המים הדרושה ולהוסיף את יתרת המים תוך כדי ערבול. יש ליישם את התרסיס מיד לאחר הכנתו.

הוראות שימוש: יוניק ניתן ליישום בכלי הריסוס/ ההגממה המומלצים במטע או במשתלה. אין לטפל ביוניק בעצים/צמחים חלשים או בגידול הנמצא בעקה. אין לרסס בתנאי שרב או כשצפוי שרב. עדיף לרסס בלילה. מנע רחף של התרסיס **אופן היישום:**

| הגידול | הזן | המטרה* | השלב הפתולוגי ומועדי היפול | המינון או הריכוז | אופן היישום | הערות |
|--|----------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|
| אבוקדו | פינקרטון | הגברת יבול בחלקות בעלות יבול נמוך | בעצים בוגרים. א. ריסוס בודד בריכוז 0.7%. בשיא פריחה מאחר. או ב. שני ריסוסים בריכוז 0.35% כ"א, בשיא פריחה מאחר (בשילוב אוראה פוספט 50 ונסוף פריחה) (בשילוב משטח פריחה אורני) א. יש הרדל בנישמי הפריחה בין שני יעדי השורה - יש לרסס כל צד בנכוד. | 0.7% | ריסוס בנפח תרסיס של 100-75 ל"מ | |
| | | | | 0.2%+0.7% | | |
| | האס פוארטה | | בעצים בוגרים. בשיא פריחה מקדים 0.7% בשילוב אוראה פוספט 50 ונסוף 2% בנסוף פריחה בריכוז 0.2% בשילוב משטח אורני. | 0.8% 1% | | |
| תמר | מ'גהול | יציוב היתמרות, הגדלת פרי הפחתת שיליפה | כשעוביים לאחר אסות ההאבוקה. הטיפול ייתן אים לשתנים | 50-75 סמ"ק/עץ | המיטן הנמוך בעצים צעירים לקראת ניבה ראשונה ועד ניבה שלישית. המיטן הגבה בעצים לקראת ניבה רביעית ואילך. המתנה בין יישום לגיד - 100 ימים | |
| שזף | יפני | צמיחה ונטטיביות, הגדלת פרי, הקמת העץ | בעצים בוגרים. באביב בפריחה מאחר עד תחילת חמטה | 2-3 סמ"ק/עץ בשנה הראשונה 1-2 סמ"ק/עץ בשנים הבאות בהתאם לצימוח | אין לטפל בעצים חלשים וללא עלים. מפעם אחת בשנה | |
| צמחי עציץ עשבוניים במשתלות כגון: סולמס, סקיבלה, מלרנגיום חזל, חרצית, ציפון סינית | צמחי ציפון | צמיחה ונטטיביות, הגדלת פריחה | - | 0.04%-0.01% | ריסוס בנפח תרסיס של 100 ל"מ | הריכוז ייקבע בכל מין לפי הניסיון המקומי |
| | | | | 0.2%-0.1% | | |
| בוגנוויליה | צמחי ציפון ונטטיביות | צמיחה ונטטיביות | באביב בתחילת צימוח | 0.3% | | |

* כלל מקרה מומלץ להתייעץ עם ההדרכה לפני השימוש ביוניק.

שילובים: אין לשלב בתכשירים נוספים, למעט התכשירים המפורטים בטבלת הוראות השימוש. **גידולים עוקבים:** יוניק נקלט גם במערכת הנשימה, אין לטפל במטע העליון היעקר תוך 3 שנים כדי למנוע עיוב צמיחה בגידול הבא. גידולים עשבוניים פחות רגישים לתכשיר, לכן לאחר עקירה עדיף לזרוע דגניים ולהימנע מזרעית גידולים רחבי עלים לפחות בשנתיים הראשונות לאחר העקירה.