



## מוסתי צמיחה למניעת נשירת פרי בתפוז, בקליפיים ובאשכולית

פאסט פרוט הינו מוסתי צמיחה המיועד להפחתה של נשירת פרי הדר לפני הקטיף. ניתן להבחין בפחיתה בנשירה בתוך 7-10 ימים לאחר היישום.

רעילות לחי במים:	רעיל ליצורים החיים במים, עלול לגרום נזקים ארוכי טווח בסביבה המימית. אין לרסס בסמוך לנחלים ולבריכות דגים
רעילות לדבורים:	רעילות לדבורים נמוכה
כניסה מחדש לשטח המטופל:	24 שעות
דרגת רעילות:	רעיל (II)

שילובים: בהדרים ניתן לשלב במשטח טיבולין.

### הוראות שימוש:

פאסט פרוט ניתן ליישום בכלי הריסוס המומלצים לשימוש בפרדס. יש לרסס בלחץ נמוך מ-4 אטמוספירות. אין ליישם על עצים צעירים או על צימוח צעיר או לפני תחילת שינוי צבע הפרי. אין ליישם ברוח או בטמפרטורות גבוהות. מומלץ לרסס בשעות הבוקר או הערב. אין ליישם לאחר גשם לפני התייבשות הנוף. גשם שירד שעה לאחר היישום לא יפגע בעילות הטיפול. אין ליישם על עצים המצויים בתנאי עקה כלשהי. מנע רחף של התרסיס לשדות ולגידולי תרבות שכנים.

הגידול	המטרה	אופן ומועד היישום	הריכוז (%)	נפח התרסיס (ל'ד')	יישום לפני קטיף (ימים)
תפוז, קליפיים, אשכולית	מניעת נשירת פרי	תחילת שינוי צבע	0.018% (18 חלקי מיליון חומר פעיל)	300-100	12

\*במקרה שניתנים שני יישומים, המירווח ביניהם יהיה 5 שבועות.

רישיון השיירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 18/ה'צ/מס' או"ם: 3082.

