




קוטל פטריות סיסטמי, להדברת מחוללי מחלות בגפן, בעצי פרי, בירקות, בצמחי תבלין ובפרחים וכן לטיפול אחר קטני בהדרים ובפרחים



הגידול	המחלה	הריכוז או המינון	נפח התרסיס	יישום אחרון לפני אסיף/ קטיף/ בציר (ימים)
פרחים:				
ורד בחממה	קמחון הוורד, עובש אפור (בוטריטיס)	0.025%	100-200 גר/ל'	
עצבנית (רוסקוס) בבית רשת	עובש אפור (בוטריטיס), קימחון	25 גר/ל'	עד 100 גר/ל'	
סולידגו, פלוקס, אסטר סולידסטר		0.025%	מעל 100 גר/ל'	
פרח שעווה	קמחנית	0.025%	100-50 גר/ל'	
טיפול לאחר קטיף:				
ורד	למניעת עובש אפור (בוטריטיס) באחסון ובמשלוח	0.05% (50 גר' ב-100 ל')	יש לרסס את פרחי הוורד הקטופים לאחר המיין טרם הכנסתם לקירור, עד לכיסוי מלא של התרסיס על גבי העלווה והפרחים. אין להכניס לקירור פרחים לחים	
עצבנית (רוסקוס)			יש לטבול את ענפי העצבנית הממיינים בתוך תמיסה המכילה פולאר ושמן קיצי בריכוז המומלץ. לאחר הטיפול חובה לייבש את הענפים טרם אריזתם	

פולאר הינו קוטל פטריות סיסטמי להדברת קימחון, קימחנית, חלפת, עובש אפור (בוטריטיס), חילדון ועובש עלים בגידולים חקלאיים. בנוסף, בטיפול אחר קטני, פולאר מונע ריקבון חומץ בהדרים ועובש אפור (בוטריטיס) בפרחים, במהלך האחסון והמשלוח.

רעילות לחי במים:	רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים.
רעילות לדבורים:	התנשיר אינו רעיל לדבורים
כניסה מחדש לשטח המטופל:	אך ורק לאחר התיישבות התרסיס ע"ג העלווה המרוססת. בבתי צמחיה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 21 שעות נוספות בשיטות המקובלות, לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי
דרגת רעילות:	מסוכן (IV)

אופן היישום:

הגידול	המחלה	הריכוז או המינון	נפח התרסיס	יישום אחרון לפני אסיף/ קטיף/ בציר (ימים)
עצי פרי:				
תפוח	קימחון התפוח, עובש בית גרעינים*	0.025%		
נקטרינה, אפרסק	קימחון האפרסק	0.015% - 0.02%**	ריסוס להרטבה מלאה של הגוף	
גפן	קימחון הגפן*			
שזיף	חלדון הגלעיניים			
שקד	חלדון הגלעיניים	0.025%		
ירקות:				
מלפפון, מלון, אבטיח, דלורית	קימחון הדלועיים	15-25 גר/ל'***	עד 100 גר/ל'	
גזר	חלפת הגזר	0.015% - 0.025%	מעל 100 גר/ל'	
חציל	קמחנית	25 גר/ל'	20-40 גר/ל'	
פלפל	קמחנית	25 גר/ל'	עד 100 גר/ל'	
עגבנייה	קמחנית	0.015% - 0.025%	מעל 100 גר/ל'	
ברוקולי, כרובית	חלפת המצליבים	25 גר/ל'	בשילוב ביו-פילם אולטרה בריכוז 0.05%	
תות שדה	קמחון תות השדה	30 גר/ל'	30-50 גר/ל'	
צמחי תבלין:				
בזיל	עובש אפור (בוטריטיס)	25 גר/ל'	40-50 גר/ל'	

הגידול	המחלה	הריכוז או המינון	הוראות הכנה
הדרים	ריקבון חמוץ	0.6% (3000 ח"מ ח"פ)	הטיפול ייעשה במערכי המיין והאריזה המצויידיים במתקן דינוג אשר מותקן בו מערבול מכני. יש לערבב תחילה 1.2 ק"ג פולאר בכמות קטנה (5-10 ליטרים) של דונג בתוך דלי עד לקבלת תמיסה אחידה. תמיסה זו יש להוסיף לחבית של 200 ליטרים, המלאה בדונג עד למחציתה, תוך כדי ערבול מתמיד. לאחר מכן, יש להשלים את מילוי הדונג בחבית. את תמיסת הדונג המוכנה, יש לרסס על פני פירות ההדר, בכמות של 1.5 ליטרים ל-1 טון של פרי. יש להמשיך בערבול במשך כל מהלך הדינוג. אין להלין תערובת מוכנה ליום המחרת

* יש לתת 2-3 ריסוסים במשך תקופת הפריחה. הראשון בתחילת הפריחה ואח"כ כל 6 ימים, בהתאם להתקדמות הפריחה.
** בהתאם לתמת הניעות.

שילובים: פולאר נמצא בטוח לשימוש, בתנאים בהם נבדק, בשילוב עם התכשירים הבאים: תות שדה - נמרוד, דומארק, קוליס.

רשיון השירותים להגנת הצמח ולביקורת מס': 94/ה"צ/1236. מס' או"ם: לא מסווג.