



קוטל חרקים

נוקס קוטל את החרקים הרגישים לו על ידי שיבוש תהליכי הגדילה, מניעת המעבר לדרגות התפתחות מתקדמות ופגיעה בפוריות הבוגרים והביצים. נוקס פועל במגע ובבליעה. לתכשיר יש כושר תנועה טרנסמינרית בצמח (אך הוא אינו סיסטמי). נוקס אינו פוגע באקריות טורפות ובצורות טפיליות, ולכן הפרת המאזן הביולוגי מועטה יחסית.



| | |
|-------------------------|---|
| רעילות לחי במים: | התכשיר רעיל ליצורים החיים במים. עלול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח בסביבה המימית. בעת הריסוס יש להקפיד שהתרסיס או שרוחף התרסיס לא יגיעו אל בריכות דגים, אגמים ונחלים |
| רעילות לדבורים: | התכשיר רעיל לרימות דבורים ולזחלי טוואי המשי. אין לרסס על צמחים בשלב הפריחה וזאת כדי למנוע זיהום של האבקה אשר עלול לגרום לתמותה חלקית של רימות הדבורים. אין רסס אם מהירות הרוח גבוהה מ-2 מ' לשנייה. אין לאפשר לבע"ח לרעות בחלקה שרוססה זה עתה. אין לאסוף יבול או מספוא משטח שרוסס לפני הזמן המצוין כמועד אחרון לריסוס לפני איסוף |
| כניסה מחדש לשטח המטופל: | אין להיכנס לשטח המטופל ללא הגנה מתאימה לפני התייבשות טיפות התרסיס על הגידול |
| דרגת רעילות: | מסוכן (IV) |

אופן היישום:

| הגידול | המזיק | מועד הטיפול* | המינון (ג'ד') | נפח התרסיס (ל'ד') | יישום אחרון לפני אסוף (ימים) |
|--------|-----------------|--|---------------|-------------------|------------------------------|
| גזר | פסילת הגזר | עם הופעת הביצים על הצמחים | 100 | 50-20 | |
| רימון | כנימת עש הרימון | יש להתחיל בריסוסים עם תחילת הפעילות של בוגרי כנימת עש הרימון | 0.1% | 200-150 | 14 |

*אין ליישם נוקס יותר מפעמיים בעונה. המירווח בין הריסוסים: 14 יום לפחות.

שילובים: אין לשלב נוקס בתכשירים נוספים.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 05360/צ' מס' אום: לא מסווג.